

нижняя спина, надхвостье и верхнія кроющія хвоста у него бѣлесовато-сѣрыя; рули въ основной половинѣ бѣлые, въ конечной черные съ металлическимъ блескомъ. Область распространенія *Cr. mantchuricum* ограничена, насколько пока извѣстно, горами Печилійской провинціи; такъ, его находили преимущественно въ окрестностяхъ Пекина, именно къ востоку, западу и сѣверо-западу. Въ нашей коллекціи имѣются лишь два экземпляра отъ Пржевальскаго, помѣченные Пекиномъ, и экземпляръ Базилевскаго, который въ своемъ спискѣ говоритъ, неправильно называя его *Cr. auritum*, что онъ добылъ его «изъ Сы-чуани»; несомнѣнно, что *Cr. mantchuricum* тутъ не водится, и если Базилевскій дѣйствительно получилъ свой экземпляръ въ Сы-чуани, то онъ былъ завезенный или домашній.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ дать слѣдующую синоптическую табличку видовъ рода *Crossoptilon*, по которой легко распознаются не только взрослые птицы, но и птенцы, достигшія приблизительно $\frac{1}{3}$ роста взрослыхъ и одѣвшія хотя бы отчасти нарядъ послѣднихъ. Самцы и самки окрашены одинаково и отличаются наличностью или отсутствіемъ шпоръ, которыя у молодыхъ самцовъ лишь зачаточныя. Послѣдующія экспедиціи должны приложить всѣ старанія къ тому, чтобы добыть совершенно еще неизвѣстныхъ птенцовъ въ пуховомъ и первомъ перовомъ нарядѣ.

1 (4) Преобладающая окраска птицы бѣлая. Подбородокъ, горло, щеки и по крайней мѣрѣ среднія изъ ушныхъ, которыя у старыхъ птицъ удлинены, бѣлаго цвѣта, болѣе или менѣе одноцвѣтны (если не загрязнены до рыжеватаго оттѣнка) съ бѣлой же шеей. — Общая окраска шеи и туловища варьируетъ отъ чисто-бѣлаго до бѣлесоватаго блѣднаго пепельно- или голубовато-сѣраго, никогда не бывая темнаго синевато-аспиднаго или сѣровато-синяго цвѣта.

2 (3) Рули черны отъ основанія до конца, средніе съ разноцвѣтнымъ металлическимъ блескомъ. Маховыя перья очень темныя, махи 1-го разряда темно-бурые, махи 2-го разряда черновато- или сѣровато-бурые съ большимъ или меньшимъ металлическимъ блескомъ. — Отъ с.-з. угла Юнь-нани по ю.-з. Сы-чуани до Мупина. — HODGSON, Journ. As. Soc. Bengal, VII, 1838, pl. 46; SCLATER, List. Phas., pl. 4 (1863); ELLIOT, Mon. Phas., I, pl. 14; HUME et MARSHALL, Game B. Ind., I, pl. to p. 115; GRAY et MITCHEL, Gen. B., III, pl. CXXV (*Cr. auritum*).

Cr. tibetanum (HODGS.) 1838.

3 (2) Боковые рули у основанія съ большимъ или меньшимъ количествомъ, иногда только въ видѣ каймы на наружномъ опахалѣ, сѣраго или бѣлаго цвѣта. Маховыя перья измѣняются отъ почти чисто-бѣлыхъ до свѣтло-сѣрыхъ, махи 2-го разряда безъ всякихъ слѣдовъ металлическаго блеска. — Отъ Да-дзянь-лу въ западной Сычуани до верховьевъ Голубой рѣки, истоковъ Меконга и перевала Со на верхнемъ теченіи Салуэна. — VERREAUX, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, IV, 1868, pl. III; ELLIOT, Mon. Phas., I, pl. 15; DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, pl. 107. — *Cr. leucurum* SEEB. 1892.

Cr. drouyni M.-EDW. 1868.

4 (1) Преобладающая окраска птицы не бѣлая. Подбородокъ, горло, щеки, ушныя, у старыхъ птицъ удлиненыя, рѣже передняя часть шеи и перевязь на за-