

240. *Phasianus decollatus strauchi* PRZEW.

- 4400'. 5 ♂, 2 ♀ adlt., 10—12. I. 1900, оаз. Сого-хото, южн. Ала-шань, въ 100 в. отъ поднож. Нань-шаня.
- с. 9000'. 2 ♂, 1 ♀ adlt., 29—30. I. 1900, Ярлынь-голь, на сѣв. скл. Сѣв.-Тэтунгскаго хреб., Нань-шань.
- 7100'. 6 ♂, 1 ♀ adlt., II. 1900, кум. Чортэтань, дол. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.
- 7100'. 2 ♂ adlt., нач. III. 1900, кум. Чортэтань.
- 8640'. ♂ pull., 24—25. VIII. 1901, окр. гор. Дань-гэръ-тинь, ю. скл. вост. ок. Нань-шаня.

Птенецъ приблизительно въ $\frac{3}{4}$ величины старой птицы, съ короткимъ хвостомъ; окраска въ общемъ какъ у старой самки, но на верхней части межлопаточной области и на бокахъ зоба и груди начали уже появляться характерныя для взрослога самца перья; перья на бокахъ тѣла коричневья, но еще лишены мѣднаго блеска и въ довольно большихъ неправильныхъ пятнахъ.

Старые самцы изъ оазиса Сого-хото отличаются отъ самцовъ изъ бассейна рѣки Тэтунга болѣе рѣзко выраженнымъ золотистымъ, не такимъ рѣзко мѣдно-краснымъ, цвѣтомъ передней части межлопаточной области и слегка золотистымъ цвѣтомъ боковъ груди; а также тѣмъ, что конечныя черныя съ металлическимъ отливомъ пятна длинныхъ перьевъ боковъ груди занимаютъ лишь большую часть, а не всю ширину вершины пера. Два самца съ сѣвернаго склона Сѣверо-Тэтунгскаго хребта имѣютъ промежуточную окраску перьевъ межлопаточной области и боковъ тѣла, такъ что стоятъ еще ближе къ птицамъ изъ долины Тэтунга. Нельзя не признать, что птицы изъ Сого-хото составляютъ переходъ къ *Ph. decollatus*, вполне типичныхъ особей котораго Н. М. Пржевальскій добылъ въ центральной части Алашаньскаго хребта; тѣмъ не менѣе онѣ несомнѣнно ближе къ типичному *Ph. strauchi*, чѣмъ къ типичному *Ph. decollatus*. Обособлять эту согохотинскую форму въ подвидъ я не рѣшаюсь, потому что *Ph. strauchi* варьируетъ въ томъ же направленіи если не на всемъ пространствѣ своей области распространенія, то во всякомъ случаѣ на ея восточной окраинѣ— въ южной Гань-су и сѣверной Сы-чуани, гдѣ мы встрѣчаемъ съ другой стороны и разновидность *Ph. decollatus*, составляющую въ свою очередь переходъ къ *Ph. strauchi*. Такъ, изъ четырехъ самцовъ *Ph. strauchi*, добытыхъ М. М. Березовскимъ въ 1893 и 1895 гг., одинъ къ сожалѣнію безъ точнаго мѣстонахожденія и другой изъ Хой-сяна въ юго-восточной Гань-су вполне типичные *Ph. strauchi*, третій изъ ущелья Хо-цзи-гоу, къ сѣверу отъ Лунь-н'гань-фу въ сѣверной Сы-чуани, представляетъ переходъ къ *Ph. decollatus*, четвертый же изъ деревни Мугуачи въ вершинѣ ущелья