

SWINНОЕ¹⁾ по экземплярамъ, купленнымъ на рынкѣ Chung-King'a въ юго-западной Сы-чуани. DAVID и OUSTALET²⁾ приводятъ его для хребта Tsin-ling'a, отдѣляющаго большую сѣверную часть провинціи Шень-си отъ меньшей южной, для этой послѣдней части, юго-восточной Гань-су (Koko-poor oriental у DAVID'a), восточной Сы-чуани, Мупина въ центральной части Сы-чуани, восточной Юнь-нани и западной Гуй-чжоу (Quei-chou). Я не знаю, не смѣшивалъ ли его DAVID съ *Ph. strauchii*, который въ то время не былъ еще извѣстенъ этому автору, но полагаю, что сомнѣніе можетъ быть только относительно крайней юго-восточной границы (в. Юнь-нань и з. Гуй-чжоу) намѣченной области, потому что нахождение его въ сѣверо-восточной Сы-чуани и въ юго-восточной Гань-су подтверждается существованіемъ тутъ разности. Наконецъ, экземпляры Пржевальскаго изъ Алашаньскаго хребта заставляютъ предполагать распространеніе *Ph. decollatus* по сѣверо-восточной Гань-су. Къ сожалѣнію экземпляры, добытые докторомъ Пясецкимъ, не снабжены точными мѣстонахожденіями, а между тѣмъ они могли бы помочь намѣтить восточную границу распространенія этого фазана.

Область распространенія *Ph. strauchii* довольно ограничена по сравненію съ таковой *Ph. decollatus*. Она протянулась отъ культурной полосы у сѣвернаго подножія Нань-шаня черезъ восточную оконечность этого хребта и Амдосское нагорье до южной Гань-су и самой сѣверной части Сы-чуани. Распространеніе его до Мупина, которое считаетъ вѣроятнымъ С. А. Бутурлинъ³⁾, основываясь на отождествленіи съ этимъ видомъ *Ph. decollatus* (по SWINНОЕ) apud DAVID et OUSTALET, а тѣмъ болѣе до Да-дзянь-лу, для котораго его приводитъ OUSTALET⁴⁾ только на основаніи упоминанія о какомъ то фазанѣ въ письмѣ принца Г. Орлеанскаго, я считаю пока еще сомнительнымъ, но для первой мѣстности не невозможнымъ.

Въ близкомъ сосѣдствѣ съ *Ph. strauchii* въ сѣверной Сы-чуани, именно подъ Сунъ-панемъ въ Сюе-шанѣ, живетъ близкій къ нему видъ, недавно описанный мною⁵⁾ *Ph. sühschanensis*, соединяющій на себѣ признаки *Ph. vlangalii* (одноцвѣтныя лопаточныя), *Ph. strauchii* (рѣзкая мѣдно-коричневая окраска) и *Ph. elegans* (непрерывное распространеніе металлически-зеленаго цвѣта отъ горла по серединѣ зоба и груди до брюха).

1) Proc. Zool. Soc. London, 1870, p. 135.

2) Ois. Chine, p. 411, pl. 100 (1877). — Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, VII, 1871, Bull., p. 11.

3) Ibis, 1904, p. 410.

4) Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) VI, 1894, p. 79.

5) Bull. Acad. Sc. St.-Petersb., (5) XXIV, 1906, pp. 83—92.