

Относительно окраски голых частей тѣла П. К. Козловъ замѣчаетъ: «радужина темно-бурая; клювъ голубой, къ вершинѣ темнѣе; восковица и ноги сѣрыя».

«Убитая самка была очень жирна; фолликулы яичниковъ достигали величины дробинъ № 6».

М. А. Мензбиръ любезно сообщаетъ мнѣ объ этомъ экземплярѣ слѣдующее:

«Экземпляръ П. К. Козлова въ общемъ чрезвычайно сходенъ съ самкой моей коллекціи отъ г. Корѣева, добытой 20 января на рѣкѣ Или близъ Дубуна и начавшей линять. Кукунорская птица въ болѣе поношенномъ перѣ, отъ чего ея общій тонъ свѣтлѣе. Новыя перья пробиваются на затылкѣ, на задѣ шеи и надхвостѣ».

242. *Gennaia saceroides* MENZB., sp. nov.

4970'. ♂ 1-a vest., 29. IX. 1901, оаз. Дынъ-юанъ-инъ (Фу-ма-фу), южн. Алашань.

М. А. Мензбиръ говоритъ объ этомъ экземплярѣ слѣдующее:

«Экземпляръ изъ Дынъ-юанъ-ина принадлежитъ къ вновь установленному мною виду *G. saceroides*. Прежнія экспедиціи Н. М. Пржевальскаго добыли въ свою очередь двухъ самокъ этого сокола:

♀, зима, земля Чахаровъ (I путешествіе; № 4)

♀, 10. III. 1880, Дань-гэръ-тинъ, Гань-су (III путешествіе; № 217).

«По массивности самокъ и по сизому надхвостью, при намѣченной поперечной полосатости верхней стороны тѣла и при поперечно-полосатомъ хвостѣ, этотъ соколь близокъ къ *G. milvipes*, но нижняя сторона тѣла, какъ у *G. sacer*, т.-е. безъ поперечной полосатости на бокахъ и штанахъ. Отъ *G. sacer gurneyi* отличается тѣмъ, что свѣтлыя пятна-полосы верхней стороны не охристо-желтыя, какъ у *G. sacer*, а кирпично-рыжія, какъ у *G. milvipes*.

«*G. saceroides* распространенъ отъ земли чахаровъ и восточнаго Наньшаня на востокъ до восточной Персіи (экземпляръ Н. А. Заруднаго изъ Муджнабада) на западѣ. Къ сѣверу онъ идетъ до степей юго-западной Сибири, къ югу — вѣроятно до Тибета. Подробности объ этой интересной, но еще мало изученной формѣ сообщу въ моей монографіи соколовъ».