

гахъ и призывавшихъ родителей клокотаньемъ; достать ихъ къ сожалѣнію не удалось. Старики держались около гнѣзда и самецъ былъ убитъ для коллекціи. Рядомъ съ гнѣздомъ сокола, въ нѣсколько большей выемкѣ, находилось гнѣздо *Eulabeia indica*; гусь и гусыня тревожно летали во все время моего пребыванія у гнѣзда».

Въ половинѣ іюня того же года П. К. Козловъ нашель, «переваливъ черезъ южную часть хребта Амнэнъ-коръ, въ южныхъ предгорьяхъ его второе гнѣздо этого вида; оно помѣщалось въ отвѣсномъ конгломератовомъ обрывѣ, ниспадавшемъ къ рѣчкѣ, и содержало трехъ, поступившихъ въ коллекцію» почти взрослыхъ птенцовъ, у которыхъ пухъ сохранился мѣстами лишь на нижней сторонѣ тѣла и по бокамъ межлопаточной области.

Далѣе *G. milvipes* былъ встрѣченъ дважды (въ іюнѣ на рѣч. Бы-чю и въ августѣ на оз. Рхомбо-мцо) въ бассейнѣ Голубой рѣки, но въ дневникѣ по поводу этихъ находокъ нѣтъ замѣтокъ.

Въ бассейнѣ Меконга *G. milvipes* былъ найденъ въ передній путь только на южномъ склонѣ водораздѣла между системами этой рѣки и Голубой, именно у южнаго подножія перевала Чжони-ла, на рѣчкѣ Ёныр-чю, относящейся къ системѣ лѣвыхъ притоковъ нижняго теченія Дзэ-чю. Далѣе и на мѣстѣ зимовки онъ повидимому не встрѣчался, вѣроятно вслѣдствіе сильно изрѣзаннаго характера мѣстности. П. К. Козловъ замѣчаетъ въ дневникѣ: «Въ бассейнѣ Меконга соколъ этотъ обыкновененъ, но попадаетъ исключительно тамъ, гдѣ мѣстность носитъ характеръ плато не ниже, а чаще и много выше, 11.000 футовъ абсолютной высоты». Такъ, онъ былъ встрѣченъ снова на истокахъ той же Гэ-чю, «гдѣ характеръ долины совершенно напоминалъ изобиловавшее пищухами (*Lagomys*) нагорье Тибета. Здѣсь мы нашли» въ послѣдніе дни февраля мѣсяца «пару, занявшую уже мѣсто гнѣзда на утесѣ».

Въ области лѣвыхъ притоковъ верхняго теченія Голубой рѣки или Ды-чю, «видъ этотъ былъ тоже весьма обыкновененъ». Въ дневникѣ имѣется указаніе на самца, добытаго у южнаго подножія перевала Гонъ-ла, гдѣ экспедиція была 28 марта, но возможно, какъ мы уже видѣли, что это тотъ же самецъ, который помѣченъ на этикеткѣ переваломъ Мири-ла.

Судя по экземплярамъ, *G. milvipes* былъ найденъ затѣмъ какъ въ области истоковъ (рѣч. Сэргъ-чю) Желтой рѣки, такъ и въ котловинѣ озера Куку-норъ.

Наконецъ, «видъ этотъ очень часто попадался на глаза въ оазисѣ Дынъ-юань-инъ» (гор. Фу-ма-фу) въ южной части Алашаньской пустыни».

М. А. Мензбиръ сообщаетъ мнѣ объ экземплярахъ коллекціи П. К. Козлова слѣдующее.