

«Всѣ выше перечисленные экземпляры принадлежатъ къ типичному *G. milvipes*, который характеризуется сильнымъ развитіемъ пепельно-сизаго цвѣта на надхвостьѣ у старыхъ самцовъ, тогда какъ даже у старыхъ самокъ надхвостье очень рѣдко бываетъ замѣтно сѣро, и неправильною полосатостью хвоста, почти всегда съ 12-ью темными поперечными полосами, которыя или очень искривлены, или не совпадаютъ на наружномъ и внутреннемъ опахалѣ. Перья боковъ и голени поперечно-полосаты.

«Западная форма, *G. milvipes hendersoni*, отличается болѣе интенсивнымъ кирпично-краснымъ основнымъ цвѣтомъ верхней стороны тѣла, отсутствіемъ пепельно-сизаго надхвостья, гдѣ у самцовъ перья темно-бурья съ блѣдно-рыжими поперечными полосами, и правильной поперечной полосатостью хвоста при 10—11 темныхъ поперечныхъ полосахъ, которыя одинаковой ширины со свѣтлыми. У *G. milvipes milvipes* темныя полосы до старости шире свѣтлыхъ, но у очень старыхъ самцовъ обратно.

«Полосатый балобанъ, отличающійся отъ *G. sacer* своей массивностью и поперечной полосатостью боковъ тѣла и перьевъ голени, распространенъ отъ Алайскаго хребта на западѣ до Кореи на востокѣ и отъ Сайрамъ-куля (Кульджинскій районъ) на сѣверѣ до Непала на югѣ. *G. hendersoni* или западная форма извѣстна съ Алая, изъ-подъ Яркенда и съ Сайрамъ-куля; она же конечно принадлежитъ Памиру, гдѣ этотъ соколъ наблюдался, но не добытъ. На востокъ отсюда, какъ въ Монголіи, такъ и въ Тибетѣ и Китаѣ, распространенъ типичный *G. milvipes*, являющійся восточной формой этого вида и притомъ формой болѣе широко распространенной. Я знаю только одинъ экземпляръ этого сокола, переходный между его западной и восточной формой, это самка, добытая въ октябрѣ въ сѣв. Тибетѣ (въ моей коллекціи). Если бы не нѣкоторая неправильность въ полосатости хвоста, эту самку надо было бы отнести къ западной формѣ. Но откуда въ дѣйствительности эта самка — сказать трудно: въ октябрѣ она могла быть далеко отъ мѣста своего гнѣздовья. Вѣдь залетаетъ же *G. altaica* зимою подъ Яркендъ и на Куку-норъ. Самое западное мѣстонахождение *G. milvipes* — Малая Азія, судя по экземпляру, жившему въ Лондонскомъ Зоологическомъ саду и нарисованному Вольфомъ въ его Zoological Sketches и въ Дрессеровскихъ Birds of Europe. Но этотъ экземпляръ былъ дрессированный и откуда онъ попалъ къ своему первоначальному владѣльцу совершенно неизвѣстно».