

247. *Erythropus vespertinus* (LINN.).

- ♀ adlt., 28. V. 1899, средн. теч. Иртыша.
 3480'. 3 ♂ adlt., VI. 1899, станица Алтайская.
 3480'. ♀ adlt., VII. 1899, станица Алтайская.

«Гнѣздится и обыкновененъ у станицы Алтайской; держится на опушкѣ лѣса и часто сидитъ на высохшихъ вершинахъ деревьевъ».

248. *Tinnunculus tinnunculus tinnunculus* (LINN.).

- 3480'. ♂ juv. 1-a vest., VII. 1899, станица Алтайская.
 4820'. ♂ (♀) adlt., 18—20. I. 1900, оаз. Лянъ-чжоу у сѣв. подн. вост. Нань-шаня.

Молодой самецъ, если только полъ помѣченъ вѣрно, въ нарядѣ самки; махи у него еще съ пленками у основанія.

Взрослый самецъ, ошибочно помѣченный самкой, относится къ типичному подвиду, такъ какъ наствольныхъ полосокъ, прикасающихся къ проксимальному краю трехугольныхъ пятенъ на перьяхъ межлопаточной и лопаточныхъ областей, у него нѣтъ; замѣтна лишь темная линия стержня.

«У станицы Алтайской довольно обыкновенны. Часто встрѣчался и на всемъ протяженіи Гобійскаго Алтая, но въ Гоби замѣчены только въ болѣе привѣтливыхъ ея мѣстахъ какъ на сѣверной, такъ и на южной окраинѣ. Въ оазисахъ у сѣверной окраины Нань-шаня часто наблюдался во время своихъ охотъ за жаворонками и *Passer montanus*».

Сем. *Aquilidae*.

249. *Milvus melanotis* TEMM. et SCHL.

- с. 4500'. ♂ adlt., VII. 1899, верховье р. Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.
 7100'. ♂ adlt., 1—4. III. 1900, кум. Чортэнтанъ на р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.
 с. 12.000'. ♂ juv., 1/2 VIII. 1901, хреб. Южно-Кукунорскій.

Болѣе молодой самецъ по крайней мѣрѣ прошлогодній: опереніе сильно изношено, перья головы, зашейка, межлопаточной области и всего низа соловья съ бурыми краями, лопаточныя бурья съ бѣлыми кончиками.

На Укѣкѣ «попадался не часто и только парами».

У кумирни Чортэнтанъ въ бассейнѣ Тэтунгъ-гола «весной 1900 первая одиночная особь была замѣчена 9 февраля; какъ и всѣ только-что прилетавшія одиночки она держала себя крайне строго. Въ послѣдней трети