

февраля, особенно же въ первой марта коршуновъ летѣло порядочное количество». Во второй половинѣ марта въ окрестностяхъ кумирни Дацанъ-сумэ къ востоку отъ г. Дань-гэръ-тина на южномъ склонѣ восточнаго Нань-шаня въ долину рѣки Донкыра, «изобиловавшей одиночно стоящими ильшами (*Populus*), птицы эти держались массами. Въ этотъ періодъ спариванія птицы были сильно возбуждены, летали высоко въ воздухѣ, быстро бросались оттуда внизъ зигзагами, звонко разсѣкая воздухъ своими крыльями, и все время издавали свистящіе звуки. Въ это время птицы не такъ назойливы, какъ обыкновенно. По наблюденію моихъ товарищей Казнакова и Ладыгина торгующіе хлѣбомъ китайцы, идя съ корзиною за спиной по улицѣ, то и дѣло машутъ своими длинными рукавами черезъ плечо съ цѣлью отгонять коршуновъ, пользующихся каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы похитить хлѣбъ. Китайцы такъ привыкаютъ къ этимъ отмахиваніямъ, что продѣлываютъ ихъ и безъ особенной надобности, совершенно машинально, ставя въ недоумѣніе европейцевъ».

Въ апрѣлѣ 1900 г. «въ восточномъ Цайдамѣ было найдено обширное гнѣздо, сложенное изъ сухихъ вѣтвей на тамариксовомъ кустѣ; 27 апрѣля изъ него были взяты два, видимо уже насиженныхъ яйца», которыя однако не поступили въ коллекцію.

250. *Haliaëtus leucoryphus* (PALL.).

с. 6000'. ♂ 3-а vest., нач. VIII. 1899, Суокъ, верхнее теч. Кобдо, Алтай 1).

с. 5500'. ♂ 3-а vest., нач. VIII. 1899, средн. теч. Кобдо, Алтай.

Обѣ птицы приблизительно въ третьемъ нарядѣ, судя по окраскѣ хвоста, который въ основной половинѣ и въ конечной четверти темный, а въ предвершинной четверти бѣлый съ темной пестриной по краямъ среднихъ паръ рулей; на двухъ крайнихъ парахъ у экземпляра съ Кобдо бѣлый цвѣтъ почти сплошной, а у птицъ съ Суока бѣлая пестрина только появляется.

«Встрѣчался всюду на пути по Алтаю — въ долину Бухтармы, на Укѣкѣ, рр. Ойгоръ и Суокъ. Державшаяся здѣсь пара была сначала осторожна, но потомъ птицы освоились и стали летать къ нашей кухнѣ, гдѣ одна изъ нихъ и была убита». Слѣдующія замѣтки въ дневникѣ П. К. Козлова отнесены къ *H. albicilla*, но добытый на среднемъ теченіи Кобдо экземпляръ оказался *H. leucoryphus*. «На всемъ пути слѣдованія по бассейну Кобдо попадался изрѣдка парами или одиночками; рыбы въ мѣстныхъ рѣ-

1) Въ дневникѣ первый изъ этихъ экземпляровъ помѣченъ «♂, VII. 1899, р. Ойгоръ».