

близости. По рѣкѣ Джагынъ-голь», впадающей въ протоку, соединяющую озеро Оринъ-норъ съ выше лежащимъ Джаринъ-норомъ (оз. Экспедиціи) «этотъ сарычъ встрѣчался часто сидящимъ по глинистымъ обрывамъ береговъ рѣки; онъ большой любитель пищухъ» (*Lagomys*).

Въ бассейнѣ Голубой рѣки *Arch. hemiptilopus* былъ встрѣченъ тотчасъ какъ экспедиція перевалила черезъ Водораздѣльный хребетъ, именно 10 іюля въ урочищѣ Джабу-рабу на верховьѣ Хи-чю. Въ этотъ день «нашли третье гнѣздо», мѣстоположеніе котораго къ сожалѣнію не описано въ дневникѣ, «съ четырьмя большими птенцами, изъ которыхъ самый крупный (экз. e) взятъ въ коллекцію, остальныхъ же трехъ, прокормивъ ночь на бивуакѣ мясомъ, мы снова отнесли на другое утро въ гнѣздо. На противоположномъ обрывистомъ берегу сидѣли старики, тотчасъ же направившіеся къ гнѣзду какъ только удалился человекъ». На рѣкѣ Ба-чю 21. VIII былъ добытъ еще не достигшій величины взрослой птицы молодой (экз. f.), о которомъ въ дневникѣ нѣтъ отмѣтки. На возвратномъ пути, въ области правыхъ притоковъ Голубой рѣки нахождение этого вида подтверждается двумя экземплярами, изъ коихъ одинъ былъ добытъ въ системѣ Намъ-чю, а другой на И-чю, оба въ концѣ марта 1901 г. «Эти сарычи довольно обыкновенны въ бассейнѣ Голубой рѣки; особенно часто я наблюдалъ ихъ на И-чю и вообще по дорогѣ отъ Голубой въ Хоръ-гамдзей. Въ это время (конецъ марта) начался уже періодъ спариванія: самецъ носился въ воздухѣ, налеталъ на самку, топталъ ее и направлялся дальше, тогда какъ самка оставалась сидѣть на мѣстѣ и только встряхивала крыльями». Вѣроятно къ этому виду относится и слѣдующая замѣтка: «на р. Дза-чю, притокѣ Голубой, найденъ гнѣздящимся мохноногій сарычъ, державшійся на обрывистомъ берегу рѣки; въ осмотрѣнномъ 6-го мая 1901 г. гнѣздѣ было лишь одно яйцо».

Въ бассейнѣ Меконга въ передній путь *Arch. hemiptilopus* былъ добытъ 27. VIII. 1900 г. на рѣкѣ Чжанъ-чю системы нижняго теченія Гэ-чю и на верховьяхъ этой послѣдней рѣки 28. II. 1901 на обратномъ пути. На мѣстѣ зимовки въ Лунъ-ток-ндю съ 20. XI. 1900 по 19. II. 1901 наблюдался, судя по привезеннымъ экземплярамъ только *Buteo plumipes*. Сомнѣваюсь однако, чтобы изъ этого можно было сдѣлать выводъ, что *Arch. hemiptilopus* летитъ на зимовку южнѣе: вѣроятно онъ тутъ осѣдлъ и зимою не былъ собранъ только случайно.

Вышеприведенныя данныя о гнѣздованіи фактически опровергаютъ апріорныя предположенія SHALOW'a<sup>1)</sup>, что видъ этотъ гнѣздится въ сѣвер-

1) Journ. f. Ornith., 1901, p. 427.