

ныхъ широтахъ, а въ нагорной центральной Азіи является будто бы только пролетной или зимующей птицей. Впрочемъ гнѣздованіе его въ сѣверо-западной Монголіи и другихъ частяхъ высокой Азіи было извѣстно уже и раньше, такъ что прибѣгать къ этимъ соображеніямъ не было никакой надобности.

254. *Buteo leucocephalus* HODGS.

с. 8000'. ♂ adlt., 12—13. III. 1900, окр. Синина, южн. скл. вост. Нань-шаня.
с. 5000'. ♀ adlt., 1/3. XI. 1901, къ югу отъ Урги, сѣв.-вост. Монголія.

Обѣ птицы взрослыя, выведшіяся не въ данномъ году; монгольская совершенно сходна съ рисункомъ *B. hemilasius* DAVID & OUSTALET¹⁾, другая относится къ рыжей разности, напоминая вышеописанныхъ птицъ рыжей разности *Archibuteo hemiptilopus*, но повсюду болѣе блѣдной окраски.

Этотъ видъ принимался П. К. Козловымъ то за *Buteo leucurus*, то за *Arch. hemiptilopus*, почему замѣтки о распространеніи, основанныя на наблюденіяхъ, не утилизирую.

255. *Buteo plumipes* HODGS.

с. 11.000'. ♂, ♀ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ г. Чамдо.
11.960'. ♀ adlt., 23. XI. 1900, рѣч. Ронъ-чю, впад. въ Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
12.320'. ♀ adlt., 21. II. 1901, рѣч. Ю-чю, прит. Рэ-чю, сист. Меконга.

Птица съ Ю-чю относится къ рыжей разности, остальные три къ темно-бурой, изображенной SHARPE'омъ²⁾. Плюсна у всѣхъ экземпляровъ оперена замѣтно больше, чѣмъ у *B. desertorum*.

«Найденъ въ бассейнѣ Меконга въ небольшомъ числѣ вѣроятно зимующимъ. Строго придерживается дна долины и носится, издавая голосъ, напоминающій нашихъ сарычей, вдоль скатовъ ущелій то по одиночкѣ, то парами; изрѣдка случалось наблюдать и трехъ вмѣстѣ».

256. *Buteo leucurus* NAUM.

с. 9000'. ♂ adlt., 1/3. V. 1900, восточный Цайдамъ.

Взрослая птица рыжей разности; хвостъ ярко-рыжій въ слѣдахъ темныхъ перевязей, изъ которыхъ болѣе всего сохранилась въ видѣ обособленныхъ пятенъ предконечная; основаніе рулей бѣлое.

Въ дневникѣ нѣтъ никакихъ замѣтокъ, касающихся этого вида.

1) Ois. Chine, tab. IX.

2) Cat. B. Brit. Mus., I, tab. VII, fig. 1.