

257. *Buteo desertorum* (DAUD.).

с. 4500'. ♀ juv. 1-a vest., II/2. VII. 1899, верховье Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.

Молодая, выведенная въ данномъ году, птица съ совершенно отросшими уже махами и рулями. Ничѣмъ не отличается отъ рыжихъ молодыхъ, напр., изъ подъ Петербурга.

«Быль обыкновененъ въ долину, покрытой густымъ высокоствольнымъ лѣсомъ. Въ 20-ыхъ числахъ іюля пара съ молодыми кружилась надъ лѣсомъ, оглашая воздухъ рѣзкимъ крикомъ. Охотно вылетаютъ и на опушку лѣса, гдѣ усаживаются на сухія вершины деревьевъ».

258. *Astur palumbarius khamensis* BIANCHI,

Bull. Brit. Orn. Club, XVI, 1906, p. 70.

11.960'. ♂ adlt., II/3. II. 1901, уроч. Лунь-ток-ндо, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

«Тетеревятникъ сталъ встрѣчаться намъ съ сентября въ бассейнѣ Меконга; особенно часто наблюдался онъ какъ въ этомъ мѣсяцѣ, такъ и въ октябрѣ на р. Баръ-чю. На зимовкѣ при Рэ-чю добытъ экземпляръ, убитый на только-что пойманномъ хищникомъ зеленомъ дятлѣ. Какъ тутъ, такъ и на Баръ-чю птица была очень строга».

Не знаю, относятся ли наблюденія на Баръ-чю въ этой формѣ, которую я принужденъ признать за новую. Къ сожалѣнію П. К. Козловъ взялъ въ коллекцію лишь одинъ экземпляръ. Тѣмъ не менѣе не трудно убѣдиться, что привезенная имъ птица отличается отъ типичнаго *Astur palumbarius* необыкновенно темной окраской верха тѣла, напоминая въ этомъ отношеніи сѣверо-американскаго *Astur atricapillus*, отъ котораго однако тотчасъ же отличается характеромъ рисунка нижней стороны тѣла. Верхъ головы, испещренный просвѣчивающимися бѣлыми основаніями перьевъ зашеекъ, ушные и бока шеи у нея глубокаго чернаго цвѣта, какъ у *Ast. atricapillus*, безъ бураго оттѣнка, который всегда замѣтенъ у *Ast. palumbarius palumbarius*; межлопаточная область, переднія изъ лопаточныхъ и малыя кроющія крыла аспидно-черныя (RIDGWAY, Nom. Col., II, 2), всѣ перья съ черными ободками опять-таки какъ у *Ast. atricapillus*; остальной верхъ тѣла аспидно-сѣрый (RIDGWAY, II, 5), края перьевъ темнѣе, а стержни черные; у *Ast. palumbarius palumbarius* верхъ туловища и крыльевъ значительно болѣе свѣтлаго сѣраго цвѣта, передняя же часть его всегда безъ рѣзко выраженной черноты. Низъ тѣла окрашенъ какъ у *Ast. palumbarius palumbarius*, но бѣлыя поперечныя перевязи уже, такъ что рисунокъ получается мельче. У *Ast. atricapillus* бѣлыя и бурыя перевязи на перьяхъ низа тѣла еще уже, чѣмъ у *Ast. palumbarius khamensis*,