

особенно на зобѣ, гдѣ онѣ утратили уже хорошо выраженный у *Ast. khamensis* характеръ правильныхъ поперечныхъ перевязей и представляютъ зигзаги, придающіе зобу струйчатый рисунокъ; кромѣ того у *Ast. khamensis* продольныя полоски на перьяхъ зоба и груди представлены лишь черной линіей самага стержня, тогда какъ у *Ast. atricapillus* онѣ образуютъ узкія настволья, ширина которыхъ больше линіи стержня. Характеръ рисунка зоба представляетъ хорошій видовой признакъ *Ast. atricapillus*, легко отличающій этого ястреба отъ формъ *Ast. palumbarius*, подвидомъ котораго я считаю *Ast. khamensis*, не смотря на разительное сходство послѣдняго съ американскимъ видомъ по окраскѣ верхней стороны тѣла.

На основаніи сказаннаго легко установить слѣдующій діагнозъ этой формы:

Astur delinatione gastraei, in specie praepectoris, ut in *A. palumbario*, solummodo fasciis regularibus transversis albis et brunneis nonnihil angustioribus, sed coloratione notaei obscurissimo *A. atricapillo* simillimus: pileum, auchenium basibus albis transparentibus plumarum variegatum, auriculariae et latera colli nigerrimae; interscapulium, scapulares anteriores tectricesque alae superiores minores schistaceo-nigrae (RIDGWAY, Nom. Col., II, 2) plumis nigro marginatis; superficies alarum superior, scapulares posteriores, tergum, uropygium, tectrices caudae superiores schistaceo-cinereae (RIDGWAY, II, 5), marginibus plumarum obscurioribus; praepectus, pectus, abdomen tibialesque fasciis regulariter transversis albis et brunneis, illis nonnihil angustioribus, his densius sitis ut in *A. palumbario*, delineatae, sed non ut in praepectore *A. atricapilli* valde irregularibus, fere obsolete, unduliformibus; plumae gastraei totius lineis tenuissimis nigris, tantum a rachidibus ipsis formatis, sed non ut in *A. atricapillo* striis suprarrachidalibus latioribus ornatae. — Long. corporis ♂ circa 520, latitudo c. 900, long. alae 320, caudae c. 242, tarsi 74, digiti medii cum ungue c. 64, culminis denudati per arcum 30, per chordam 26, a margine ceromae ad apicem 20 mm.

Цвѣтъ голыхъ частей по отмѣткѣ П. К. Козлова: радужина ярко-желтая; клювъ темный, у основанія голубой; восковица зеленая; ноги желтыя, когти черныя.

259. *Accipiter nisus ladygini* BIANCHI,

Bull. Brit. Orn. Club, XVI, 1906, p. 69.

- 13.040'. a, b. 2 ♂ adlt., 1. X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.
 13.040'. c. ♂ juv. 1-а vest., X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю.
 с. 11.000'. d, e, f. ♂ adlt., 2 ♂ juv. 1-а в., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ г. Чамдо.