

Первые два самца линяютъ; одинъ, судя по почти сплошь коричневой груди болѣе старъ, смѣнилъ уже все опереніе за исключеніемъ отрастающихъ еще крайнихъ маховъ 1-го разряда; второй мѣняетъ какъ мелкое перо, такъ и махи съ рулями. Взрослый самецъ съ Дза-чю очень старъ и окончилъ линяніе. У трехъ птенцовъ въ первомъ нарядѣ рули и махи совершенно отрасли; окраска ихъ настолько различна какъ сверху, такъ и снизу, что въ первое время П. П. Сушкинъ и я склонны были относить ихъ къ различнымъ формамъ и считать самаго рыжаго изъ нихъ за молодого *Acc. nisus*; однако одинъ изъ нихъ представляетъ нѣчто среднее между двумя другими и въ концѣ концовъ мы рѣшили отнести ихъ къ одной формѣ. Разница сводится частью на индивидуальныя различія, частью же на возрастъ.

Судя по тремъ взрослымъ самцамъ, мы имѣемъ тутъ дѣло несомнѣнно съ новой формой по меньшей мѣрѣ подвидоваго значенія; по крайней мѣрѣ изъ 40 слишкомъ старыхъ самцовъ нашей богатой коллекціи *Acc. nisus* я ни у одного не нахожу такой темной верхней стороны тѣла и такой почти сплошной коричневой окраски зоба и груди, какъ у привезенныхъ изъ бассейна Меконга птицъ. Если темной верхней стороной тѣла *Acc. ladygini* и можетъ напоминать къ сожалѣнію не имѣющагося въ нашей коллекціи *Acc. melanoschistus* НУМЕ изъ Гималаевъ, то остается все-же рѣзкое отличіе отъ этой формы въ окраскѣ груди, а можетъ быть и въ величинѣ: *Acc. melanoschistus*, говорятъ, значительно крупнѣе *Acc. nisus*, тогда какъ новая форма величиной не отличается отъ обыкновеннаго перепелятника. Къ сожалѣнію мы до сихъ поръ не имѣемъ въ литературѣ точныхъ измѣреній *Acc. melanoschistus*. Въ первой замѣткѣ объ этомъ видѣ НУМЕ¹⁾ не даетъ размѣровъ; въ слѣдующей— тотъ же авторъ²⁾ приводитъ для самца, послужившаго типомъ формы, крыло въ $9.75'' = 247.5 \text{ mm.}$, но BLANFORD³⁾ совершенно правильно сомнѣвается въ точности опредѣленія пола этого оригинальнаго экземпляра. BIDDULPH⁴⁾ упоминаетъ о самцѣ съ крыломъ почти въ $10'' = 254 \text{ mm.}$, но правильность опредѣленія пола и у этой птицы весьма сомнительна. Нѣсколько лучше обстоитъ дѣло съ самками: по НУМЕ'у⁵⁾ длина крыла варьируетъ у нихъ отъ 10.12 до $10.50'' = 257—266.5 \text{ mm.}$, тогда какъ максимальная длина крыла у *Acc. nisus* считается по GURNEY⁶⁾ равной $10.2'' = 259$. BIDDULPH⁶⁾ добылъ порядочное число экземпляровъ

1) Ibis, 1869, p. 356.

2) Rough Notes, pp. 128—131.

3) Stray Feathers, V, 1877, p. 482.

4) Ibis, 1881, p. 41.

5) Ibis, 1875, 479.

6) Ibis, 1882, p. 269.