

*Acc. melanoschistus* въ Гильгитѣ, но не счелъ нужнымъ дать ихъ размѣры.

У стараго самца *Accipiter ladygini* верхъ и бока головы, слегка нарушенный бѣлыми основаніями перьевъ зашеекъ, межлопаточная область, лопаточныя и переднія изъ малыхъ кроющихъ крыла темнаго аспидно-чернаго цвѣта (RIDGWAY, Nom. Col., II, 2), а не аспиднаго (RIDGWAY, II, 4) съ бурымъ оттѣнкомъ, какъ у самыхъ темныхъ *Acc. nisus*; нижняя спина, надхвостье, верхнія кроющія хвоста и остальное крыло, за исключеніемъ черныхъ маховъ 1-го разр., черновато-аспиднаго цвѣта (RIDGWAY, II, 3), тогда какъ у самыхъ темныхъ *Acc. nisus* эти части тѣла варьируютъ отъ аспидно-сѣраго (RIDGWAY, II, 5) съ бурымъ оттѣнкомъ до темно-сѣраго (RIDGWAY, II, 6); бока шеи, зобъ, грудь и ея бока покрыты частью сплошь коричневыми въ конечной половинѣ перьями, частью же такими, на которыхъ сохранились узкія бѣлыя перевязи; во всякомъ случаѣ коричневаго цвѣта на перечисленныхъ частяхъ тѣла у двухъ самыхъ старыхъ самцовъ много больше, чѣмъ у изображенныхъ DRESSER'омъ самца изъ Англіи (tab. 355, fig. dextra) и самки изъ Шотландіи (tab. 355, fig. sinistra); у болѣе молодого, хотя тоже уже взрослога, самца съ Баръ-чу сплошныхъ коричневыхъ перьевъ мало, но рыжія перевязи на всѣхъ перьяхъ у него шире, чѣмъ бѣлыя, такъ что коричневый цвѣтъ все-же преобладаетъ надъ бѣлымъ.

Изъ трехъ молодыхъ самцовъ, сохранившихъ еще характерныя для перваго наряда рыжіе ободки на перьяхъ верха тѣла, самый темный барчюскій: верхъ тѣла у него почти черный, сѣроваты только надхвостье и верхнія кроющія хвоста; рыжіе концы и ободки всѣхъ перьевъ уже, чѣмъ у остальныхъ двухъ, на перьяхъ боковъ зашейка рыжій цвѣтъ распространяется по краямъ къ основанію пера, такъ что тутъ его больше, чѣмъ на остальныхъ частяхъ верха тѣла; зобъ и грудь въ бѣлыхъ и бурыхъ поперечныхъ полосахъ, изъ которыхъ первая шире второй, а эти окаймлены съ проксимальнаго или дистальнаго своего края рыжимъ, на нѣкоторыхъ же перьяхъ заключаютъ въ себѣ рыжее наствольное пятнышко. Одинъ изъ дзачюскихъ самцовъ сверху бурѣе предыдущаго и рыжіе ободки у него повсюду много шире, особенно на верхѣ головы и на махахъ третьяго разряда; зобъ и грудь не въ бурыхъ, а въ рыжихъ поперечныхъ полосахъ, только окаймленныхъ или прорѣзанныхъ по срединѣ бурымъ цвѣтомъ. У третьяго, несомнѣнно самаго молодого изъ трехъ, характеръ окраски иной: середина всѣхъ перьевъ у него черновато-бурая, но ободки очень широки, особенно на головѣ, перья же боковъ, зашейка и лопаточной области нужно назвать коричневыми съ рѣзко очерченными сферически-треуголь-