

ными черными наствольями; неприкрытая часть маховъ 3-го разряда рыжая съ черной перевязью передъ концомъ; перья низа тѣла бѣлыя въ бурыхъ, окаймленныхъ рыжимъ перевязяхъ, изъ которыхъ самая дистальная имѣетъ V-образное или сердцевидное очертаніе и несетъ болѣе рѣзкое, чѣмъ у перваго дзачюскаго самца, рыжее наствольное пятнышко; брюхо и штаны у этого экземпляра не въ перевязяхъ, какъ у предыдущихъ двухъ, а въ неправильно сердцевидныхъ бурыхъ съ рыжимъ пятнышкахъ, что и говоритъ между прочимъ за ранній возрастъ птицы.

У всѣхъ трехъ молодыхъ самцовъ на сѣроватомъ фонѣ хвоста рѣзко выдѣляются по четыре широкихъ черныхъ перевязи, изъ коихъ первая почти скрыта верхними кроющими хвоста. У одного изъ старыхъ самцовъ (a) тоже четыре перевязи, а у другихъ двухъ по пяти; тутъ перевязи уже и менѣе явственны вслѣдствіе того, что основной фонъ рулей много темнѣе, аспидно-сѣраго цвѣта.

Размѣры этихъ шести экземпляровъ слѣдующіе:

	Крыло.	Хвостъ.	Плюсна.	Средн. палець съ когтемъ.	Оголенный culmen по хордѣ.	Culmen отъ воковицы до вершины по хордѣ.
a. ♂ adlt. . .	205 mm.	75 mm.	53.5 mm.	42.0 mm.	16.25 mm.	11.30 mm.
b. ♂ adlt. . .	215 »	75 »	54.0 »	40.0 »	16.00 »	10.50 »
d. ♂ adlt. . .	215 »	77 »	55.5 »	— »	16.50 »	11.75 »
c. ♂ juv. . .	213 »	78 »	55.0 »	42.5 »	14.50 »	11.00 »
e. ♂ juv. . .	210 »	75 »	55.0 »	— »	15.00 »	11.00 »
f. ♂ juv. . .	205 »	70 »	53.0 »	41.5 »	15.00 »	11.00 »

Для взрослого самца можно установить слѣдующій діагнозъ: *Accipiter coloratione generali et magnitudine Acc. niso similis, sed corpore supra multo obscuriore coloreque praepectoris et pectoris praevallescente cinnamomeo: pileum et latera capitis, auchenium basibus albis plumarum transparentibus nonnihil variegatum, interscapulium, scapulares anteriores tectricesque alae superiores minores schistaceo-nigrae* (RIDGWAY, Nom. Col., II, 2), *sed non schistaceae* (RIDGWAY, II, 4) *brunneo tinctae ut in speciminibus obscurissimis Acc. nisi; tergum, uropygium, tectrices caudae superiores et superficies reliqua alae, primariis nigris exceptis, nigriscenti-schistaceae* (RIDGWAY, II, 3), *sed non ut in Acc. niso schistaceo-cinereae* (RIDGWAY, II, 5) *brunneo tinctae vel obscure-cinereae* (RIDGWAY, II, 6); *latera colli, praepectus, pectus lateraque pectoris cinnamomea fasciis albis transversalibus paucis ornatae vel fasciis latioribus cinnamomeis fascisque albis angustioribus delineatae. Long. corporis circa 330, latit. c. 570, long. alae 205—215, caudae 75—78, dig. med. c. ung. 40—42.5, culminis denudati per chordam 16.00—16.50, culminis a margine ceromae ad apicem per chordam 10.50—11.75 mm.*