

Цвѣтъ голыхъ частей П. К. Козловъ отмѣчаетъ такъ: «У старыхъ птицъ съ Баръ-чю: радужина красная; клювъ темный, но основаніе нижней челюсти голубое; восковица желто-зеленая; ноги зеленовато-желтыя; когти черные. У молодого самца съ Баръ-чю: радужина ярко-желтая; клювъ голубой, къ вершинѣ темный; восковица желто-зеленая; ноги зеленовато-желтыя».

«Этотъ перепелятникъ былъ не рѣдокъ въ долинѣ рѣки Баръ-чю и держался преимущественно по склонамъ горъ, поросшимъ древесной (ель, арца) растительностью». Кроме того встрѣченъ, какъ доказываютъ привезенные экземпляры, и на главной вѣтви Меконга къ сѣверу отъ Чамдо.

260. *Circus cineraceus* (MONT.).

3480'. ♂ adlt., 1/2. VII. 1899, станица Алтайская.

Объ этомъ видѣ въ дневникѣ замѣтокъ нѣтъ.

261. *Circus macrurus* (S. G. Gmel.).

с. 4000'. ♀ juv. 1-a vest., 15. VII. 1899, дол. р. Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.

с. 5500'. ♂? juv. 1-a vest., 1/2. VIII. 1899, средн. теч. р. Кобдо, Алтай.

Обѣ птицы молодыя, выведенныя въ данномъ году.

Первая птица «убита изъ трехъ, летѣвшихъ вмѣстѣ», т. е. изъ выводка.

262. *Circus cyaneus* (Linn.).

с. 4000'. ♂? juv. 1-a vest., 1/2. VII. 1899, дол. р. Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.

с. 5000'. 2 ♂ adlt., 20. IX. 1899, уроч. Далынъ-туру къ ю.-в. отъ оз. Шаргинъ-цаганъ-норъ, Гобійскій Алтай.

9630'. ♀ juv., 9. IV. 1900, болото Иргицыкъ, вост. Цайдамъ.

Въ дневникѣ только отмѣтки о мѣстѣ и иногда днѣ добычи экземпляровъ. Самка съ Иргицыка прошлогодняго вывода.

263. *Circus spilonotus* KAUP.

3740'. ♂ adlt., 27—28. IX. 1899, южный конецъ оз. Кара-усу, Алтай.

«Держался вмѣстѣ съ камышевымъ лугомъ».