

264. *Circus aeruginosus* (LINN.).

с. 5500'. juv. 1-а vest., 1/3. VIII. 1899, среднее течениe р. Кобдо, Алтай.
 с. 5500'. ♀ juv. 1-а vest., 1/3. VIII. 1899, среднее течениe р. Кобдо, Алтай.

Кромъ Кобдо упомянутъ еще съ южнаго конца озера Кара-усу.

При знаніи дифференціальныхъ признаковъ распознаваніе луней не представляетъ труда, а между тѣмъ путешественники ихъ легко смѣшиваютъ. Такъ П. К. Козловъ считалъ всѣ перечисленные виды кромъ *C. aeruginosus* за *C. cyaneus*, а обѣ экземплярѣ, оказавшемся *C. spilonotus*, замѣчаетъ: «Переходное, отъ коричневаго къ сѣдому, опереніе; оригинально и красиво; очень рѣдкое явленіе». Полагаю поэтому, что синонитическая табличка для опредѣленія видовъ является тутъ далеко не излишней.

- 1 (4) Наружное опахало пятаго маха 1-го разряда, формой напоминающаго скорѣе шестой, чѣмъ четвертый, суживается къ концу слабо и постепенно, безъ рѣзкой вырѣзки на свободномъ краѣ въ конечной части. Внутреннее опахало четвертаго маха 1-го разряда тоже безъ вырѣзки.
- 2 (3) Начало вырѣзки на внутреннемъ опахалѣ первого маха 1-го разр. и на наружномъ опахалѣ второго маха 1-го разр. удалено отъ конца кроющихъ маховъ 1-го разр. приблизительно на дюймъ или 25 mm., а то и больше. Плюсна короче 63.5 (56.0—58.5) mm. — *C. pygargus* LINN.

C. cineraceus (MONT.).

- 3 (2) Начало вырѣзки внутренняго опахала первого маха 1-го разр. и наружнаго опахала второго маха 1-го разр. приходится почти у конца кроющихъ маховъ 1-го разр. Плюсна длиннѣе 63.5 (67.0—68.5) mm. — *C. pallidus* SYKES; *C. swainsoni* Смитъ.

C. macrurus (S. G. GMEL.).

- 4 (1) Наружное опахало пятаго маха 1-го разр., формой напоминающаго больше четвертый, чѣмъ шестой махъ, разомъ суживается къ концу, благодаря рѣзкой вырѣзкѣ въ конечной части свободнаго края. Внутреннее опахало четвертаго маха 1-го разр. тоже съ рѣзкой вырѣзкой на концѣ свободнаго края.

- 5 (6) Первый махъ 1-го разр. короче, равенъ или немнога, не болѣе какъ на 13 mm. ($1\frac{1}{2}$ "), длиннѣе седьмого.

C. cyaneus (LINN.).

- 6 (5) Первый махъ 1-го разр. значительно длиннѣе седьмого, всегда больше, чѣмъ на 13 mm. ($1\frac{1}{2}$ ").

- 7 (8) Клювъ по хордѣ, отъ восковицы на конькѣ до вершины, значительно короче 19 mm.

C. melanoleucus (FORST.).

- 8 (7) Клювъ по хордѣ, отъ восковицы на конькѣ до вершины, не короче 19 mm.

- 9 (10) У старого самца преобладающій цвѣтъ нижней груди и брюха бѣлый; у самокъ и молодыхъ хвостъ въ темныхъ перевязяхъ или въ слѣдахъ ихъ¹⁾.

C. spilonotus KAUP.

1) Если перевязи исчезли вслѣдствіе обнашиванія и обтирания, то молодыя птицы этого вида не отличимы отъ молодыхъ *C. aeruginosus*.