

- 10 (9) У стараго самца преобладающій цвѣтъ нижней груди и брюха ржаво-бурый¹⁾; у самокъ и молодыхъ хвостъ безъ темныхъ перевязей, въ видѣ исключенія со слѣдами ихъ. — *C. rufus* Gmel. *C. aeruginosus* (Linn.).

Сем. **Vulturidae.**

265. *Gypaëtus barbatus* (Linn.).

7100'. ♂ adlt. et juv., 1—4. III. 1900, кум. Чортэнтанъ, басс. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

По отмѣткѣ П. К. Козлова радужина бѣловато-серебристая съ красивымъ краснымъ наружнымъ кольцомъ; клювъ рогового цвѣта; пальцы голубовато-сѣрые.

Тибетская экспедиція нашла бородача обыкновенной птицей въ Алтаѣ, въ восточномъ Нань-шанѣ, въ бассейнѣ Голубой рѣки, какъ на пути туда, такъ и обратно, и наконецъ въ бассейнѣ Меконга.

«Въ Алтаѣ онъ встрѣчался намъ чаще въ пустынной части; но особенно часто былъ онъ въ Нань-шанѣ». Въ окрестностяхъ кумирни Чортэнтанъ въ февралѣ и мартѣ «можно было ежедневно наблюдать этихъ красивыхъ, громадныхъ птицъ пролетающими по горнымъ склонамъ и по долинамъ около кочевій номадовъ, гдѣ онѣ подбираютъ отбросы, главнымъ образомъ кости, павшихъ или съѣденныхъ животныхъ. Чуть только встанетъ солнце ягнятники отправляются уже въ поиски за пищей, часто далеко улетая съ этой цѣлью отъ горъ, но къ ночи всегда возвращаясь сюда. На нѣкоторые мѣста птицы прилетаютъ за пищей каждый день. Сначала онѣ быстро проносятся на большой высотѣ, затѣмъ описываютъ одинъ или нѣсколько круговъ и наконецъ, опустившись на землю, быстро схватываютъ какую-нибудь кость, подходя къ ней на ногахъ. Иногда же ягнятникъ прямо опускается на землю, беретъ добычу, садится съ ней въ сторонку, а затѣмъ вскорѣ совсѣмъ исчезаетъ. Въ желудкѣ убитаго мною бородача оказались: бѣлая половина берцовой кости барана, его же колѣнная чашка и нога фазана.

«Въ бассейнѣ Голубой рѣки, на р. Хи-чю», гдѣ экспедиція была съ 15 по 21 іюля 1900 г., «ягнятники были замѣчательно доверчивы; они не-

1) У ненормально окрашенныхъ, можетъ быть необычайно старыхъ, самцовъ преобладающій цвѣтъ этихъ частей можетъ быть бѣлымъ. О такихъ экземплярахъ упоминаетъ Gurney (List Diurn. Birds of Pray, p. 115); вопросъ о принадлежности экземпляра изъ Трансильваніи, изображеннаго Dresser'омъ (В. Eur., V, tab. 327, fig. dextr.), къ этому виду споренъ; возможно, что онъ представляетъ *C. spilonotus* semiadlt.