

«Прилетали на покормку по ночамъ и были осторожны; наблюдались по верховью рѣки Кобдо въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ сѣрые (*Anser anser*) и индійскіе гуси (*Eulabeia indica*)».

Клювъ по коньку отъ границы оперенія на лбу 78.5 мм., видимая часть нижней челюсти при сложенномъ клювѣ высотою въ 11.0 мм.; число зубцовъ на рѣжущемъ краѣ верхней челюсти 26. Указанные размѣры подтверждаютъ принадлежность этого экземпляра къ сибирскому подвиду *M. arvensis*. Отъ другихъ видовъ рода *M. arvensis arvensis* и *M. arvensis sibiricus* легко отличается очень длиннымъ клювомъ, длина ноготка кото-раго откладывается въ длину конька клюва болѣе четырехъ разъ.

### 271. *Eulabeia indica* (LATH.).

с. 5000'. ♂ jun., VIII. 1899, рѣч. Хонгорлинъ, сист. нижн. Кобдо, Алтай.

«Индійскій гусь сталъ попадаться намъ впервые въ первыхъ числахъ августа по долинѣ рѣки Кобдо, но возможно, что звуки, которые мы слышили по временамъ на плато Укокъ, испускались имъ же. Здѣсь, на рѣчкѣ Хонгорлинъ или Хонуръ-уленъ держалась семья въ 7—8 штукъ. Къ монголамъ она относилась весьма довѣрчиво; кормилась или отдыхала, лежа на лугу у рѣчки подлѣ самыхъ юртъ, такъ что наши люди приняли ихъ сначала за домашнюю птицу».

На южномъ склонѣ восточного Нань-шаня «при рѣкѣ Донкыръ-хэ я наблюдалъ этихъ гусей 24 марта 1900 года на весеннемъ пролетѣ парами, которыя держали себя очень довѣрчиво».

На возвратномъ пути, въ бассейнѣ Голубой рѣки гуси эти «гнѣздились въ началѣ мая 1901 года въ долинѣ Да-чю по обрывистымъ берегамъ. Въ ущельи рѣчки Магъ-мугъ-чю, сѣвернаго притока Да-чю, 21 мая самка сидѣла еще на яйцахъ. И тамъ, и тутъ рядомъ съ гусями гнѣздились *Archibuteo hemiptilopus*, дѣлавшіе иногда попытки нападать на своихъ соѣдей. Такъ, въ ущельи Магъ-мугъ-чю одинъ изъ сарычей четыре раза старался ударить сидѣвшую на гнѣздѣ самку и заставилъ-таки ее въ концѣ концовъ слетѣть, но въ эту минуту на выручку подоспѣлъ самецъ, который, храбро отразивъ нападавшаго, пустился преслѣдоватъ не только его, но и другого изъ пары сарычей».

### 272. *Cygnopsis cygnoides* (LINN.).

3740'. ♂ adlt., 27—28. VIII. 1899, южн. бер. оз. Кара-усу, Алтай.

«Встрѣченъ нами во множествѣ на южномъ берегу озера Кара-усу и быть можетъ гнѣздится тутъ».