

276. *Nettion crecca* (Linn.).

с. 4500'. ♂ adlt. aest., VII. 1899, верховье Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.
3740'. ♂ adlt. aest., 27—28. VIII. 1899, южн. бер. оз. Кара-усу, Алтай.

«На рѣкѣ Бухтарма держалась въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ теченіе было спокойное, а грунтъ сравнительно мягокъ».

277. *Dafila acuta* (Linn.).

с. 7000'. ♀ adlt., 24—25. VII. 1899, озерко около Кара-булакъ, плато Укѣкѣ, Алтай.

П. К. Козловъ назвалъ этотъ экземпляръ «*Anas boscas*», а потому замѣткой его относительно частаго гнѣздованія этого вида на Укѣкѣ воспользоваться нельзя. «Добытая самка была съ птенцами, державшіяся вѣроятно случайно «по близости выводка самецъ» (опять-таки неизвѣстно *A. boscas* или *D. acuta*) «быстро исчезъ».

278. *Spatula clypeata* (Linn.).

3180'. ♂ adlt. aest., 25. IX. 1899, рѣка Шаргинъ-голь, прит. оз. Шаргинъ-цаганъ-норъ, хрб. Алтайнъ-нуру, Гобійскій Алтай.

«Соксунъ наблюдался 25 сентября 1899 г. на пролетѣ въ долину рѣки Шаргинъ-голь, изобилующей ключами и отличающейся сравнительной теплотой среди сосѣднихъ мѣстностей». Кроме того наблюдался на болотѣ Иргицыкъ въ восточномъ Цайдамѣ (см. *Fuligula fuligula*).

279. *Aythya ferina* (Linn.).

с. 9000'. pull. semifoss., 1/3. VIII. 1901, вост. Цайдамъ.

Птенецъ этотъ, добытый очевидно въ болотѣ Иргицыкъ, приблизительно въ половину взрослой птицы и всюду покрытъ уже перьями; пухъ остался у него однако мѣстами на межлопаточной области, на крыльяхъ и по бокамъ надхвостья; рули и махи 2-го разряда коротки, а махи 1-го разряда представлены еле вскрывшимися на вершинѣ пеньками.

Замѣтокъ въ дневникѣ П. К. Козлова объ этомъ видѣ вовсе нѣтъ, но гнѣздованіе его въ восточномъ Цайдамѣ подтверждается добытымъ птенцомъ.