

280. *Fuligula fuligula* (LINN.).

9630'. ♂ adlt., 10—11. IV. 1900, болото Иргицькь, вост. Цайдамъ.
11.010'. ♂ adlt., 10. III. 1901, р. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.

«Стайка штукъ въ 10—15 встрѣчена» въ половинѣ апрѣля 1900 г. «на озеркѣ болота Иргицькь по сосѣдству съ соксунами (*Spatula clypeata*), державшимися больше у камышей лысухами и плававшими на серединѣ озера хохлатыми гагарами (*Lophaethya cristata*).

«Затѣмъ была замѣчена стайка около 10 штукъ въ день прихода экспедиціи на верхнее теченіе Голубой рѣки или Ды-чю» т. е. на возвратномъ пути 10 марта 1901 г. «Стайка эта держалась вмѣстѣ съ *Eulabeia indica* и *Anas boscas*».

281. *Merganser serrator* (LINN.).

4490'. ♀ adlt., II/2. VIII. 1899, рѣка Буянту подъ г. Кобдо, Алтай.

«Держались стайками на быстрой, прозрачной, изобилующей рыбой рѣчкѣ».

Отрядъ Pelargiformes.

Сем. Ardeidae.

282. *Ardea cinerea* LINN.

3740'. ♀ adlt., 28. VIII. 1899, южн. конецъ оз. Кара-усу, Алтай.
8700'. ♀? adlt. nupt., II/2. III. 1900, кум. Дацанъ-сумэ, юго-вост. Нань-шань.
с. 8000'. ♂ adlt. nupt., II/2. III. 1900, окр. г. Синина, юго-вост. Нань-шань.

Птицы съ Кара-усу не имѣютъ длинныхъ брачныхъ перьевъ на головѣ, которыя уже хорошо развиты у мартовскихъ изъ Нань-шаня.

«Найдена гнѣздящаяся въ большомъ количествѣ при озерѣ Кара-усу; все сказанное о *Herodias alba* относится и къ этому виду. Въ январѣ замѣчена одинокая зимующая птица въ оазисѣ Лянъ-чжоу. Въ мартѣ, при слѣдованіи экспедиціи по деревнямъ въ окрестностяхъ Синина и Дань-гэръ-тина цапли эти наблюдались парами, сидѣвшими по утрамъ на высокихъ одиночныхъ ильмахъ. 14 марта самецъ искусно отламывалъ вѣтви, вѣроятно для гнѣзда».