

283. *Herodias alba alba* (LINN.).

3740'. ♀ adlt. hiem., 28. VIII. 1899, южн. конецъ оз. Кара-усу, Алтай.

4820'. ♂ adlt. hiem., II/3. I. 1900, оаз. Лянъ-чжоу, сѣверн. подош. Нань-шаня.

У августовской птицы клювъ совершенно уже желтый; спинныхъ брачныхъ перьевъ нѣтъ. У январскаго самца клювъ, особенно нижняя челюсть, начинаетъ чернѣть, на спинѣ начинаютъ развиваться брачныя перья.

Относится къ типичной, а не къ мелкой формѣ. Длина крыла самца 445, оголеннаго culmen 122, плюсны 190, у самки 455, 128 и 205 mm.

«Гнѣздились въ большомъ количествѣ у озера Кара-усу. Птицы часто усаживались на отмели длинными рядами, которые красиво выдѣлялись и днемъ, и вечеромъ на фонѣ воды и камышей. Ночью крикъ ихъ былъ особенно непріятенъ. Вели себя очень строго.

«Во второй трети января обособленная пара бѣлыхъ цапель держалась въ оазисѣ Лянъ-чжоу по запрудамъ и ключамъ, гдѣ зимовала».

Отрядъ *Pelecaniformes*.Сем. *Pelecanidae*.284. *Pelecanus crispus* BRUCH.

3740'. ♀ adlt., 28. VIII. 1899, южн. конецъ оз. Кара-усу, Алтай.

«Этотъ пеликанъ былъ встрѣченъ на нижнемъ теченіи рѣки Кобдо, а затѣмъ на озерѣ Кара-усу, на которомъ гнѣзвился сравнительно въ небольшомъ числѣ; держался парами или одиночными особями. Монголы зовутъ его «*хашунъ-шубу*», что значитъ баба-птица. На открытыхъ водахъ Кара-усу мои товарищи по путешествію встрѣчали пеликановъ и лебедей въ очень большомъ количествѣ».

Отрядъ *Colymbiformes*.Сем. *Podicipedidae*.285. *Lophaethya cristata* (LINN.).

13.370'. ♂, ♀ adlt., 31. V. 1900, оз. Алыкъ-норъ, южн. поднож. хреб. Бурханъ-Будда, сист. Желтой рѣки.

«Хохлатая гагара въ довольно большомъ количествѣ найдена на озерѣ Алыкъ-норъ. Въ убитой 29 мая самкѣ найдены сильно развитыя яйца, изъ которыхъ одно было уже въ скорлупѣ, но еще мягкой».