

Кромѣ того объ этомъ видѣ упоминается въ замѣткѣ о *Fuligula fuligula*, съ которой «хохлатая гагара» была найдена на озерѣ болота Иргидыкѣ, въ восточномъ Цайдамѣ, въ первой половинѣ апрѣля 1900 года.

286. *Dytes cornutus* Gmel.

с. 4000'. ♂ adlt. ptil. aest., ♀ adlt. ptil. hiem., pull. foss., VII. 1899, дол. р. Бухтармы прит. Иртыша, Алтай.

Одна изъ старыхъ птицъ еще въ лѣтнемъ нарядѣ, хотя уже почти лишилась надушныхъ пучковъ, другая сплошь въ зимнемъ. Вѣрно ли помѣченъ полъ, сказать, конечно, невозможно. Пуховой птенецъ еще малъ (общая длина около 170 мм.) и весь въ пуху.

Судя по замѣткѣ въ дневникѣ П. К. Козлова всѣ три птицы относятся къ одной семьѣ, которая держалась на озеркѣ.

Сем. *Colymbidae*.

287. *Colymbus arcticus* Linn.

с. 7000'. ♂ adlt., 25. VII. 1899, оз. Халцзань, Укюкѣ, Алтай.

с. 5000'. ♀ adlt., 11. VIII. 1899, оз. Шара-норъ, въ басс. р. Буянту близъ г. Кобдо, Алтай.

«Чернозобая гагара наблюдалась нами на нѣсколькихъ озерахъ и озеркахъ, во множествѣ разбросанныхъ на плоскогорьи Алтая — Укюкѣ, но повсюду не болѣе какъ въ 2—3 особяхъ. На озерѣ Халцзань, имѣющемъ около 5—6 верствъ въ окружности, мои товарищи встрѣтили семью изъ двухъ стариковъ съ тремя молодыми. Самецъ держалъ себя не очень осторожно и его удалось добыть, самка же не дала себя перехитрить и благополучно увела отъ преслѣдованія молодыхъ, которыя, оставаясь иногда безъ матери, вели себя тоже замѣчательно умно.

«Вторично мы встрѣтили эту гагару въ 23 верстахъ отъ города Кобдо на солоноватомъ озерѣ Шара-норъ, имѣвшемъ покрытый еще зеленымъ камышемъ островокъ. Тутъ кромѣ трехъ гагаръ были еще кряквы и турпаны (*Casarca casarca*)».

У обоихъ экземпляровъ верхъ головы и зашеекъ очень блѣднаго буровато-сѣраго цвѣта, приближающаго ихъ къ *C. arcticus pacificus* Lawr., но металлическій отливъ горла не зеленый, какъ у этой послѣдней формы, а фиолетовый.