

пределах Ордоса, проникнув туда, вероятно, вверх по течению Хуан-хэ; мы разумеем, прежде всего, один декоративный вид жуков-скакунов, *Cicindela laetescrita* Motsch., найденный Потаниным в Ордосе, но отсутствующий в Алашà; вид этот распространен по северному Китаю, исключая, впрочем, провинцию Гань-су, по южной Маньчжурии, Корее, Южно-Уссурийскому краю и Японии и совершенно чужд природе Монголии. Отсутствует в Алашà и другой, еще более красивый вид жуков-скакунов, *Cicindela resplendens* Dokht., живущий в песках Ордоса и являющийся здесь, повидимому, пережитком иных условий существования в минувший геологический период (третичный). Не менее характерно отсутствие в Алашà и некоторых других пустынных или полупустынных форм жуков уже чисто палеарктического типа, весьма обыкновенных в Ордосе, но отсутствующих в Алашà, как напр. крупная даурско-монгольская жужелица *Eupachys glyptopterus* Fisch.-W., более мелкая ордосская пустынная жужелица *Pseudotaphoxenus Potanini* Sem., ордосский хрущ-чернотелка (*Trematodes grandis* Sem.), чернотелка *Platyope ordossica* Sem., и некоторые другие. Но на ряду с этим мы видим широко распространенным как в Ордосе, так и в Алашà бескрылого жука-кравчика (*Lethrus Potanini* B. Jak.), который встречается, впрочем, и в центральной Монголии. Другой, одинаково обыкновенный и в Ордосе, и в Алашà жук, *Hoplia semicastanea* Fairm., распространен одновременно в китайских провинциях Гань-су, Шэньси, Шаньси и Чили.

«С севера и с запада Алашà не имеет никаких естественных границ, и поэтому ее фауна незаметно сливается с фауной соседних частей Монголии, особенно — западной. Ограничивающая Алашà с юга китайская провинция Гань-су влияет в фауну Алашà значительный процент форм насекомых, для Алашà, как и вообще для Монголии, строго говоря, не характерных. Сюда мы относим крупного усача *Dorysthenes (Cortognathus) paradoxus* Fald., китайского жука-пестряка — *Trichodes Sinae* Chevr., навозников: *Bolbotrypes Davidi* Fairm. и *Copris ochus* Motsch., хрущика *Anomala chamaeleon* Fairm., чернотелку *Prosodes Kozlovi* Sem., sp. n., и многие другие.

«Основной тон фауне Алашà дают все же ее пустынные части. Здесь, в сыпучих, отчасти барханных песках, создались условия, очень близкие к тем, в каких находится фауна в