

Монголии и Китайскому Туркестану *Ch. Reitteri* Brenske), *Deracanthus* Sch. (*D. Kozlovi* Suvor., sp. n.), *Neodorcadion* Ganglb. (*N. Kaznakovi* Suvor.), *Ceratophyus* Fisch.-W. (встречающийся начиная с Забайкалья *C. dauricus* Jek.), *Polyphylla* Harr. (обыкновенная в центральной Монголии (*P. alba vicaria* Sem.)), *Scarabaeus* L. (*Sc. sacer* L.), *Steropes* Stev. (*St. caspius* Stev.), *Asias* Sem. (*A. halodendri* Pall.), *Harpalodema* Rtrr. (*H. Potanini* Tshitsh.), *Corsyra* Dej. (*C. fusula* Fisch.-W.), *Chlaenius inderiensis* Motsch. и др. Весьма в этом отношении показательное отсутствие в Алаша, как и во всей вообще Монголии, эндемичных представителей рода красотелов—*Calosoma* Web. (если исключить из него подрод *Callisthenes* Fisch.-W.): в то время как в Закаспийском крае сверх других живут три местных вида *Calosoma* (*C. Petri* Sem., *C. deserticola* Sem., *C. Reitteri* Roeschke), в Алаша, как и в других частях Монголии, из настоящих (крылатых) красотелов встречаются только *Calosoma turcomanicum* Motsch. и *C. denticolle* Gebl.; последний вид особенно типичен для Алаша как свойственный одновременно степям юго-востока Европейской России и всей полосе Киргисских степей, но не встречающийся в пределах собственно Турана (отсутствует он и в Китайском Туркестане).

«Для Монголии вообще и для Алаша в частности весьма характерно широкое распространение некоторых видов в долготном направлении. Так, из восьми видов жуков-скакунов (*Cicindela*), найденных до сих пор в Алаша (*C. chiloleuca* Fisch.-W., *mongolica* Fald., *lunulata* F. в форме *littoralis* Dej., *obliquefasciata* Ad., *gracilis* Pall., *contorta* Fisch. W., *pseudodeserticola* W. Horn, *sublacerata vicaria* Sem.), первые пять поднимаются в северном направлении до нашей Иркутской губернии.

«В числе типичных для пустынь Алаша родов жуков могут быть названы еще: *Anatolica* Eschsch. (*A. mucronata* Rtrr., *A. suturalis* Rtrr. и др.), *Microdera* Eschsch. (несколько видов), *Stephanocleonus* Motsch. (красивый *St. Kozlovi* Suvor., sp. n., и др.), в особенности же эндемичные в южной Монголии роды: чернотелка *Mantichorula* Rtrr. (общий с Ордосом вид: *M. Semeponovi* Rtrr., с которым должна быть слита *M. grandis* Sem.), златка *Rhabdiscus* Sem., gen. n. (*Rh. Mongoliae* Sem., sp. n., — вид распространенный от центральной Монголии до Цайдама) и жужжелица *Hyalamara* Tshitsh. (*H. crystallina* Tshitsh., пока