

известная только из песков южного Алаша¹⁾). Нельзя при этом не отметить, что процент эндемичных в песках Монголии родов жуков совершенно ничтожен, особенно если его сопоставить с весьма значительным процентом своеобразных эндемических родов жуков в песках Турана. Всё это говорит нам о геологически недавнем, и притом только эолическом образовании и развитии сыпучих песков на равнинах Монголии.

«В связи с тем, что в Монголии не много форм жуков, претерпевших глубокие морфологические изменения под влиянием жизни в песчаной среде в течение длинных геологических периодов, что мы видим именно в фауне пустынь Турана, многие из обитателей песчаных и песчано-глинистых площадей Монголии и, в частности, Алаша, нередко живут также и на глинисто-лессовых ее участках, а отчасти и на других почвах. Вот почему в оазисе Дын-юань-ин, как и в полосе, отделяющей его от соседних гор, встречаются некоторые формы жуков, общие с пустынными пространствами Монголии, как, напр., скакуны *Cicindela mongolica* Fald и *C. contorta* Fisch.-W., чернотелки *Pterocoma vittata* Friv., *Platyope mongolica* Fald., *Cyphogenia humeralis* F. Bates, усач *Neodorcadion Kaznakovi* Suvor., жужжелица *Harpalodema Potanini* Tshitsh. Основной фон фауне оазиса Дын-юань-ина дают всё же широко распространенные в северном Китае, большей частью — вообще в Азии формы, как, напр., общие Европе и северному Китаю жужжелицы: *Dolichus halensis* Schall., *Scarites terricola* Bon., *Brosicus cephalotes semistriatus* Fisch.-W., *Nebria livida* L., представленная здесь особой местной расой; как общеизвестный в Европе и всюду обыкновенный июньский хрущ (*Amphimallus solstitialis* L.); как китайско-восточно-сибирские жужжелицы: *Poecilus fortipes* Chaud., *Chlaenius pallipes* Gebl., *Chl. stshukini* Mén., такой же скакун — *Cicindela gracilis* Pall., бронзовка *Netocia hungarica* Hrbst., представленная здесь, впрочем, местной расой; как широко распространенный в северном Китае и отчасти в Средней Азии дровосек *Trichoferus campestris* Fald., и т. п. Но на ряду с этими широко распространенными формами в окрестностях Дын-юань-ина и в подгорной полосе Алашаньского хребта водятся и такие характерные жуки, как мелкая жужже-

¹⁾ Второй вид этого рода (или подрода), *Hyalamara hyalina* Sem., известен из восточной части внутренней Монголии, где он живет в песках у Большого Хингана.