

нием улавливает слух звонкие трели овсянок (*Tisa variabilis*, *Cia godrewskii*), *Corpodacus pulcherrimus*, синиц (*Periparus ater rekinensis*, *Poecile affinis*, *Acredula calva*), славочек (*Sylvia curruca minula*) и маленьких пеночек (*Reguloides superciliosus superciliosus*, *Oreorhynchus fuscata*, *O. affinis*, *O. armandi*); там и сям перемещаются с дерева на дерево, или с одной скалы на другую—краснохвостки (*Ruticilla alaschanica*, *R. aurorea*), дрозды (*Turdus ruficollis*, *T. obscurus*, *Monticola saxatilis*); при устьях ущелий можно встретить чекканов (*Saxicola pleschanka*, *S. isabellina*), хохлатых жаворонков (*Galerida cristata lautungensis*), *Rhopophilus rekinensis rekinensis*, больших скалистых кэкликов (*Caccabis magna*), а несколько повыше, в глубине ущелья, по мелким кустарникам,—даурских куропаток (*Perdix daurica*)... По карнизам скал любят держаться каменные голуби (*Columba rupestris*), а в гущине леса—другие (*Turtur orientalis*),—иногда сиротливо протяжно проворкует первый вид или уныло-глухо пробудит тишину второй... Невдалеке, на опушке леса, на высоком можжевельнике, кормится дубонос (*Muscivora carneipes*), издавая своеобразные звуки... Среди мрачных, угрюмых утесов вдруг, на мгновение, появится, словно яркий цветок или бабочка, краснокрылый стенолаз (*Tichodroma muraria*), на которого я любил засматриваться, в особенности когда эта птичка у меня над головою перелетала поперек ущелья... По горным луговым скатам нижнего пояса, кое-где, ютились жаворонки (*Otocorys brandti brandti*), по мокрым лугам, у родников—плиски (*Motacilla leucopsis*, *Calobates boarula melanope*, *Budytes citreola*), щеврицы (*Anthus maculatus*) и кулички (*Aegialites dubia*). На высоких, часто отдельно-стоящих елях усаживались черные вороны (*Corone macrorhynchus japonensis*), тогда как красноклювые клушицы (*Graculus graculus*), забирались в скалы верхнего пояса гор, где, с криком, стайками, вились у ниспадавших каменных стен... Там же попадались и самые быстрые летуны—стрижи (*Cypselus pacificus*) обыкновенно резким шумом оглашавшие тишину; рядом со стрижами, но чаще ниже их, спокойно реяли вдоль каменных карнизов, горные ласточки (*Biblis rupestris*). По скалам, среди леса, выдавали себя завирушки (*Spermolegus fulvescens*), а по опушкам хвойной заросли—поползни (*Sitta villosa*). В мае месяце из глубины леса оригинально несло ку-ку серой кукушки (*Cuculus canorus*), а в чаще кустар-