

восеков, пока известный только из Алашаньского хребта; красивые полосатые пешие усачи: *Neodorcadion heros* В. Jak. и *N. Jakovlevi* Suvor., sp. n.; характерный листогрыз *Cystocnemis Kozlovi* Jacobs., sp. n., красивый слоник *Stephanocleonus Kozlovi* Suvor., sp. n.—Весьма характерную отрицательную черту в фауне гор Алаша представляет отсутствие в них настоящих, крупных жужжелиц рода *Carabus*. Объясняется оно, вероятно, значительной сухостью этих гор. Впрочем, пока остается детально не обследованным верхний пояс Алашаньского хребта с его альпийскими лугами, вопрос об отсутствии в нем представителей рода *Carabus* надо считать открытым.

«Те же основные черты фауны Алаша выявляются в составе населяющих ее перепончатокрылых насекомых. Так, среди ос-блестянок (*Chrysididae*), встречающиеся в этой части Монголии, мы видим, с одной стороны, виды, проходящие зонально по всей Средней Азии от Русского Туркестана через Чжунгарию, отчасти через Восточный Туркестан в западную Монголию и несколько далее в юго-восточном направлении. К таким формам принадлежат встречающиеся в Алаша блестянки: *Chrysis viridans* Rad., *Chr. maculicornis* Kl., *Chr. scutellaris* F., *Ellampus tshingiz* Sem. (in litt.), *Stilbum calens* F. Среди подобных, зонально распространенных форм есть такие, которые совершенно чужды как Русскому, так и Восточному Туркестану, и зона распространения которых пролегает через Киргисские степи и Чжунгарию; прекрасным примером форм этой категории может служить блестянка *Pseudochrysis incrassata* Spin., (ср. выше сказанное о распространении жука *Calosoma denticolle* Gebl.). С другой стороны, заметна в фауне перепончатокрылых южного Алаша примесь форм общих с горами северной Гань-су; к таким формам относятся, напр., блестянки: *Chr. buddhae* Sem., sp. n., и весьма обыкновенная в южном Алаша и красивая *Chrysis mane* Sem., sp. n., распространенная, впрочем, в западном направлении вдоль северной окраины Тибета (Куэн-луня) до Каргалыка в восточном Туркестане. Некоторые формы блестянок, как, напр., *Chrysis Barovskii* Sem., sp. n., распространены по Монголии меридионально от Алаша до Забайкалья. Местный, эндемический элемент в Алаша, именно в Алашаньском хребте и в прилегающей к нему местности, выражен в фауне блестянок следующими формами: *Chrysis alashanica*