

Дорога спорилась... незаметным образом одни за другими мелькали пашни, селения; развлечений для глаза и для ума было достаточно. Недоезжая десяти верст до Донгэра намъ повстречался симпатичный купец-андинжанец, лихо кативший в Синин верхом на откормленном белом коне. Этот молодой человек изысканно вежливо поздоровался со мною и доложил о благополучном прибытии в Донгэр главного каравана!.. А вот, наконец, и живописное местечко в узком ущелье Синин-хэ, памятное мне еще со времени тибетского путешествия. Через свирепо-клокочущую и пенистую речку перекинут высокий легкий мост, а за ним, на противоположном берегу приветливо залегает превосходный березовый лес, ниспадая по крутым склонам холмов.

Говоря вообще о растительности долины Синин-хэ приходится отметить ее бедность разнообразием и количеством родов и видов. На протяжении расстояния от Сицина до Донгэра экспедиция собрала и отметила всего около пятидесяти форм растительности, а именно: облепиха (*Hippophæe rhamnoides*), *Myricaria germanica*, *Crataegus*, *Salix*, *Berberis*, смородина (*Ribes aciculare*), *Rhododendron*, полынь (*Artemisia potanini*), репейник (*Agrimonia pilosa* var. *glandulosa*), кровохлебка (*Sanguisorba officinalis*), гречиха (*Polygonum bistorta*), крестовник (*Senecio erucifolius*), зверобой (*Dracoscephalum ruyschianum*), люцерна (*Medicago ruthenica*), подмаренник (*Galium verum* var. *trachycarpum*), шандра (*Marrubium incisum*), горечавка (*Gentiana barbata*), свердия (*Swertia chinensis*), орляк (*Pteridium aquilinum*), качим (*Gypsophila acutifolia* var. *potanini*), василистник (*Thalictrum petaloideum*), *Delphinium grandiflorum* var. *tanguticum*, *Anisodus tanguticus*, *Lancea tibetica*, *Spiranthes australis*, *Herminium monorchis*, *Vupleurum multinerve*, *Lespedeza trichocarpa*, *Triticum cornutum*, *Panicum miliaceum*, *Setaria italica*, фиалка (*Viola bulbosa*), *Anaphalis*, *Phlomis*, *Scirpus*, *Malva*, *Adenophora*, *Myosotis*, *Potentilla*, *Ajuga*, земляника *Fragaria*, *Nemophila*, *Sorbaria* и пион (*Paeonia*).

Что же касается до насекомых, тесно связанных своим распространением с характером растительного покрова (рассматриваемой долины), то нам удалось собрать на всем протяжении вдоль Синин-хэ и ее самого верхнего течения —