

Донгэр-хэ помимо жесткокрылых порядочное количество представителей полужесткокрылых<sup>1)</sup> и только одну, правда очень интересную новую форму из отряда перепончатокрылых — шмеля (Нутопортера, Bombidae) *Bombus lepidus*, sp. n.

С юга, все чаще и чаще сбегают звонкие ручьи, а в северном направлении горы постепенно выростают.

Наконец показались и башни Донгэра...

Между тем, недавно поднявшийся западный ветер усилился, надвинулись густые облака, и дождь, сначала слегка накрапывавший, превратился в настоящий ливень, сопровождавший нас до самого бивака экспедиции. Пришлось тотчас забраться в палатку и окопать свое убежище глубокой канавой, чтобы избежнуть наводнения...

Встреча с главным караваном была самая радостная, всё обстояло благополучно, верблюды отлично справились с трудной, скользкой дорогой и в целости доставили ценный багаж, сделав всё расстояние от Синина в три дневных перехода.

Городок Донгэр стоит на левом берегу той же Синин-хэ, которая выше описываемого города уже называется его именем — Донгэр-хэ; долина реки достигает около версты ширины; самый город обступают мягкие по очертаниям высоты, сложенные из красных песчаников, напластованных горизонтально и покрытых лёссом.

В конце лета, пышная горная зелень и зреющие хлеба составляют приятную картину, сглаживая впечатление грязи, пыли и суеты китайского базара. По словам местных обитателей, крепость Донгэр основана около двухсот пятидесяти лет тому назад, при династии Цин. В более отдаленные времена, крепость и местное управление сосредоточивались в местечке Чжэн-хайбу и только китайский император Шунь-чики перенес ее на двадцать верст западнее, в нынешний Донгэр, где назначил первым управителем одного из своих сыновей.

<sup>1)</sup> По части полужесткокрылых — клопов экспедиция обогатилась следующими формами: в долине Синин-хэ — *Legnotus notatus*, *Carcocoris (Antheminia) laticollis*, *Dolycoris baccarum*, *Corizus hyosciami*, *Stictopleurus nysioides*, *Eurydema gebleri*, *Zicrona coerulea*, *Pyrrhocoris sibiricus*, *Adelphocoris lineolatus*, *Lygus (s. str.) pratensis*, *L. (Orthops) mutans*, *Camptobrochis punctulatus*, *Stenodema (s. str.) virens*; в долине самого верхнего течения Синин-хэ — Донгэр-хэ — *Carcocoris pudicus*, *Eurydema maracandicum*, *Stenocephala* sp., *Poeciloscytus brevicornis* и *P. palustris*.