

Жизнь членов экспедиции скоро вошла в свою обычную колею; я производил астрономические, метеорологические наблюдения, занимался фотографией, писал дневник и готовил отчет за второй — кукунорский период путешествия. Препараторы ежедневно экскурсировали в окрестностях, но несмотря на сравнительное обилие птиц, новых или не знакомых нам родов и видов пока не встречалось.

Попрежнему, в прозрачной ясной синеве неба гордо парили: бородатый ягнятник (*Gypaetus barbatus*), гриф монах (*Vultur monachus*), а иногда и гриф гималайский (*Gyps himalayensis*); только сильный голод заставлял этих царственных пернатых спускаться к жилищам человека, и искать каких-либо мясных отбросов. К вечеру, величественные хищники всегда удалялись в скалы, с которыми почти никогда не расставался более изящный и более благородный по натуре — орел беркут. По окраине оазиса, изредка, проносился стрелою сокол *Gennaia milvipes milvipes*; в садах держались тетеревятники (*Astur pallumbinus*), сторожившие многочисленных фазанов, и перепелятники (*Astur nisus*), охотившиеся за более мелкими птишками. По вечерам или даже поздно ночью, подле обрывов или высоких стен, часто раздавалось унылое гуканье филина, которому вторил серый сычик (*Athene*). Около нашего жилища постоянными гостями считались черный ворон (*Corvus corax*), черная ворона, галочки (*Coloeus neglectus*, *C. dauricus*) и сорока (*Pica bactriana*). С ближайших гор в наш уголок залетали и клушицы-грион (*Graculus graculus*), звонко перекликавшиеся своими melodичными голосами.

По деревьям оазиса, там и сям, держались удоды, овсянки (*Cia godlewskii*) и непременно присутствовал дятел (*Dendrocopos cabanisi cabanisi*); в гущине береговых зарослей Хуан-хэ много раз наблюдались голубые сороки (*Cyanopolius cyanus*), камышевые стренатки (*Cynchramus cshoeniclus*, *C. pallasi*), фруктоеды (*Carpodacus rubicilloides*, *C. pulcherrimus*, *C. stoliczkae*), *Pterorhinus davidi*, синицы — *Leptopoécile sophiae*, *Poécile affinis*, *Acredula calva* и вертлявая кустарница (*Rhopophilus pekinensis pekinensis*); в густой листве, сцепившейся по верхушкам деревьев,

¹⁾ *Carpodacus stoliczkae* предпочитает держаться в лёссовых обрывах или глинисто-каменистых холмах, неподалеку от воды.