

частях долины. По мокрым лугам встречались — *Agrodroma richardi*, желтая плиска (*Budytes citreola*); там и сям по долине — маленькие сорокопуты (*Otomela isabellina*), пустынные славки (*Sylvia nana*), камышевки (*Acrocephalus arundinaceus orientalis*),¹⁾ чекканы (*Saxicola deserti atrigularis*, *S. isabellina*), вертлявая кустарница (*Rhopophilus pekinensis albosuperciliatus*), ласточки (*Hirundo rustica gutturalis*), стрижи (*Cypselus pacificus*). На утренней и вечерней заре, у караванных животных, пролетали полуночники (*Caprimulgus europaeus plumipes*); по отмелям водоемов нередко срывался с резким свистом улит-черныш (*Helodromas ochropus*), а из соседних прибрежных зарослей вылетал красавец фазан (*Phasianus satscheuensis*), чтобы переместиться в более безопасное место. Над прозрачными водами Эцзин-гола довольно часто реяла скопа (*Pandion haliaetus*), гнездо которой помещалось на усохшей вершине столетнего великана — тополя, красиво стоявшего на извилине, у одного из самых больших и обильных рыбой водоемов.

Представителями рыб в бассейне Эцзин-гола являются: карась (*Carassius carassius auratus*) и пескарь (*Nemachilus yarkanensis*), о последнем говорит Г. Н. Потанин²⁾, а представителями «вредных тварей», как выражались мои казаки — скорпион, тарантул и проч., от которых мы нередко ограждались волосяными арканами, представляющими довольно надежное заграждение от упомянутых тварей.

После мертвенної тишины и однообразия пустыни, долина Эцзин-гола, несмотря на свой жалкий вид, показалась нам раем. Воздух был заметно влажнее и чище, ветер уже не обжигал дыхательных путей, а приносил отрадную свежесть, ночью температура понижалась до 8.5° С. Мои спутники безустали полоскались в воде, мылись сами и мыли или стирали белье. За обедом, вместо опротивевшего консервированного мяса, мы теперь лакомились свежей бараниной, ухой и жареной рыбой, ежедневно добываемой в потребном количестве.

¹⁾ Голосистые, крикливые, не лишенные своеобразной гармонии, камышевки оправдывали свое характерное название, юясь исключительно в прибрежных камышевых зарослях...

²⁾ Там же, стр. 455.

Из пресмыкающихся в пизовые Эцзин-гола нами добыты, по определению С. Ф. Царевского, лягушка (*Rana amurensis*) и новый вид жабы (*Bufo Kozlovi*).