

наружной окраины долины рѣки, гдѣ почва болѣе солонцовата и песчана, встрѣчаются: *джинилъ* (*Halimodendron argenteum*), *саксаулъ* (*Haloxylon ammodendron*), *тамарискъ* (*Tamarix* sp.) и обширныя площади *дырисуна* (*Lasiagrostis splendens*), одного изъ самыхъ характерныхъ растений всѣхъ степей Внутренней или, такъ называемой, Средней Азии отъ Каспійскаго моря до Собственнаго Китая.

Изъ звѣрей въ береговыхъ рощахъ Урунгу водятся *кабаны* (*Sus scrofa azer*), *косули* (*Cervus pygargus*) и *волки* (*Canis lupus*), также *лисицы* (*Canis vulpes*), *зайцы* (*Lepus* sp.) и *барсуки* (*Meles taxus*). Среди птицъ больше разнообразія, хотя все таки здѣшняя орнитологическая фауна не можетъ похвалиться своимъ богатствомъ, даже въ періодъ весенняго пролета. Въ бѣльшемъ обилии замѣчены нами были въ апрѣлѣ: *орланы* (*Haliaeetus albicilla*, *H. Macei*), *скопы* (*Pandion haliaetus*), *коршуны* (*Milvus melanotis*), *черныя вороны* (*Corvus orientalis*), *сороки* (*Pica leucoptera*), *галки* (*Corvus monedula*); *скворцы* (*Sturnus purpurascens?*), гнѣздящіяся во множествѣ въ дуплахъ старыхъ деревьевъ; *пѣночки* (*Phyllopneuste tristis*); *синицы-ремезы* (*Aegitalus pendulinus*), висячія гнѣзда которыхъ часто попадались на глаза. Кромѣ того обыкновенны были *дятлы* (*Picus leucnotus*, *P. canus*, *P. minor*); *бородатая синица* (*Parus barbatus*), *бухарскія синицы* (*Parus bucharensis*) и *стрыя куропатки*, (*Perdix cinerea*). Поближе къ наружной окраинѣ долины рѣки часто попадались *сорокопуты* (*Lanius isabellinus*), *славки* (*Sylvia curruca*) и *чекканы* (*Saxicola atrogularis*, *S. torio*). По самой рѣкѣ и на небольшихъ болотцахъ или озеркахъ, образованныхъ пересохшими ея рукавами, встрѣчались въ достаточномъ числѣ *гуси* (*Anser cinereus*, *A. cygnoides*), *утки* (*Anas boschas*, *A. crecca*), *гоголи* (*Bucephala clangula*), *крахали* (*Mergus merganser*) и *бакланы* (*Phalacrocorax carbo*). Послѣдніе были въ особенности обильны въ первой половинѣ апрѣля, такъ какъ встрѣчали на Урунгу множество рыбы, которую нельзя было добывать на покрытомъ еще льдомъ оз. Улюнгурѣ.

Мы также усердно занимались рыболовствомъ во все время двадцати-дневнаго слѣдованія вверхъ по Урунгу, но добыли здѣсь только пять видовъ рыбъ. Вѣроятно, бѣльшаго разнообразія не имѣется и въ самомъ Улюнгурѣ, въ которомъ, нужно замѣтить, рыболовство вовсе не производится, хотя рыбы, по всему вѣроятію, великое множество. На Урунгу, изъ пяти найденныхъ нами видовъ, *голавли* (*Squalius* sp.) встрѣчались въ невѣроятномъ обилии; сколько кажется, они направлялись вверхъ по рѣкѣ для метанія икры. Въ меньшемъ количествѣ, но все таки обильны были, по заливамъ и озеркамъ, крупные (до 12 дюй-