

ныхъ буграхъ; питаются же влажными вѣтками описываемаго растенія, слѣдовательно могутъ обходиться и безъ воды. Кромѣ того, саксауль Ѳдятъ антилопы хара-сульты (*Antilope subgutturosa*) ¹⁾, зайцы и (въ Чжунгаріи) дикіе верблюды. Вѣроятно, имъ также пользуются при сильной засухѣ и другіе травоядные звѣри пустыни.

Осѣдлыхъ птицъ въ саксаульникахъ держится немного. Всего чаще здѣсь встрѣчаются саксаульный воробей и саксаульная сойка. Лѣтомъ по саксаулу также мало гнѣздится пернатыхъ, но на пролетѣ въ саксаульныхъ заросляхъ находять для себя временный отдыхъ и кой-какую пищу многочисленныя пташки. Пресмыкающіяся (ящерицы, змѣи) въ саксаульникахъ рѣдки; земноводныя не живутъ вовсе.

Другое, еще болѣе важное для обитателей пустыни, растеніе при- Дырисунъ.
надлежить къ семейству злаковъ и называется монголами *дырисунъ*,
киргизами—*чїй*; научное же его
имя *Lasiagrostis splendens*.

Подобно саксаулу, дырисунъ распространенъ по всей Внутренней Азіи; къ сѣверу заходить до 48° сѣв. шир.; южная же его граница, въ мѣстностяхъ нами изслѣдованныхъ, проходитъ по окраинѣ Сѣвернаго Тибета къ Цайдаму, немного южнѣе 36° сѣв. шир. Здѣсь описываемое растеніе, правда уже чахлое, поднимается до 13,000 футовъ абс. высоты ²⁾.

Въ Монголіи дырисунъ ростеть всего обильнѣе по долинѣ Желтой рѣки, тамъ гдѣ она огибаетъ Ордось; встрѣчается спорадически и всегда лишь небольшими площадями. На Таримѣ, въ Гань-су и Сѣв. Тибетѣ дырисунъ не ростеть вовсе; на Кукунорѣ и въ Цайдамѣ довольно рѣдокъ.



Дырисунъ (*Lasiagrostis splendens*).

¹⁾ У киргизовъ *кара-курюкъ*; то и другое название означаютъ „чернохвостая“.

²⁾ Послѣдній дырисунъ найденъ былъ нами въ Сѣв. Тибете въ уроцищѣ Дынсы-обо, у южной подошвы горъ Бурханъ-Буда. Въ горахъ Нань-шань, къ югу отъ оазиса Са-чжеу, дырисунъ поднимается до 11,200 фут. абс. выс.