

лыхъ видовъ, изъ которыхъ болѣе обыкновенны: *больдуру*, или *больдурукъ* (*Syrnartes paradoxus*), весьма характерная птица для пустынь всей Внутренней Азии; *саксаульная сойка* (*Podoces Hendersoni*), *пустынный вьюрокъ* (*Erythrospiza mongolica*), *воронъ* (*Corvus corax*) и *рогатый жаворонокъ* (*Otocoris albigula*); рѣже встрѣчаются *мохноногий сычъ* (*Athene plumipes*) и *саксаульный воробей* (*Passer ammodendri*). Пролетныя птицы являются здѣсь также въ весьма ограниченномъ числѣ, такъ какъ многіе виды, главною своею массою, облетаютъ описываемую пустыню, захватывая отчасти лишь западную ея окраину. Дѣйствительно, Чжунгарская пустыня представляетъ весьма невыгодное мѣсто для пролета птицъ, разъ по своему собственному безплодію и безводію, а затѣмъ потому, что далѣе на югъ, вплоть до Индіи, лежатъ самыя непригодныя, пролетнымъ птицамъ мѣстности: сначала высокая стѣна Тянь-шаня, далѣе Таримская пустыня, а за нею громадное плоскогорье Тибета. Вотъ почему многіе виды пернатыхъ направляются съ Енисея и верхней Оби, вѣроятно, не прямо на югъ, но облетаютъ Чжунгарскую и другія названныя пустыни, вдоль западныхъ подножій Алтая и Тянь-шаня, на верховья Сыръ и Аму-дарьи и уже отсюда, черезъ Памиръ и Гиндукушъ, попадаютъ въ Индію. Этимъ, болѣе удобнымъ, путемъ, вѣроятно, пользуются даже сильныя птицы, каковы лебеди и журавли. Тѣ и другіе замѣчены нами на пролетѣ въ пустыняхъ Чжунгаріи и Лобъ-нора только какъ рѣдкость; между тѣмъ, весьма обыкновенны на оз. Зайсанѣ, а лебеди и на оз. Улюнгурѣ. Правда, громадная масса утокъ, появляющихся раннею весною на Лобъ-норѣ, летитъ отсюда прямо черезъ Тянь-шань и пустыню на сѣверъ; но эти утки находятъ, на рано вскрывающемся Таримѣ, прекрасное для себя мѣсто отдыха и все-таки, какъ показали мои наблюденія весною 1877 г., попадаютъ на Лобъ-норъ съ юго-запада и запада, т. е. пересѣкаютъ изъ Индіи Тибетское нагорье въ самомъ узкомъ его мѣстѣ. Осенью же, по словамъ Лобъ-норцевъ, на ихъ озерѣ пролетныхъ утокъ бываетъ гораздо меньше, вѣроятно потому, что возвращаясь обратно, онѣ не пускаются напрямикъ черезъ Чжунгарскую пустыню.

Рыбы въ этой послѣдней нигдѣ нѣтъ, за исключеніемъ р. Урунгу и оз. Улюнгурса. Земноводныя нами также не найдены. Изъ пресмыкающихся же обильны ящерицы, принадлежащія исключительно къ двумъ родамъ — *Phrynoscephalus* и *Podarces*.

Теперь о дикой лошади и о дикомъ верблюдѣ.

Дикая лошадь.

Дикая лошадь, единственный экземпляръ которой находится въ музее С.-Петербургской Академіи Наукъ, недавно описана нашимъ зооло-