

воды нѣтъ нигдѣ, до самаго оазиса Са-чжеу. Нѣтъ здѣсь также станцій и вообще какого-либо жилья человѣческаго; даже кочевникамъ невозможно жить. Китайцы, проѣзжая этою дорогою, запасаются кормомъ для своихъ муловъ; верблюды же находятъ себѣ достаточно пищи и въ подобной пустынѣ.

Своротивъ на Са-чжеускую дорогу и пройдя по ней версть 20, мы неожиданно встрѣтили горы *Бэй-сянь*, о которыхъ было упомянуто выше. Эти горы, по сообщенію китайцевъ, тянутся съ запада отъ Карашара (составляя, быть можетъ, продолженіе Курукъ-тага), а на востокъ соединяются съ юго-восточными отрогами Тянь-шаня. Горы Бэй-сянь.

По своему характеру, горы Бэй-сянь, за небольшими исключеніями, представляютъ отдѣльные холмы или группы холмовъ, достигающихъ лишь незначительной (отъ 100—300 фут., рѣдко болѣе) относительной высоты и набросанныхъ въ безпорядкѣ на высокому (около 5 т. фут. абс. выс.) поднятіи этой части Хамійской пустыни. Определеннаго гребня въ описываемыхъ горахъ нѣтъ, хотя общее ихъ направленіе, какъ сказано выше, отъ запада къ востоку.

Изъ горныхъ породъ здѣсь встрѣченъ темно-сѣрый доломитъ, но исключительно преобладаютъ наносныя толщи глины съ галькою. Сами горы совершенно бесплодны. Только по ущельямъ и долинамъ встрѣчается крайне бѣдная растительность, характерная для всей вообще южной Гоби: *Calligonum mongolicum*, *Reaumuria songarica*, *Zygophyllum xanthoxylon*, *Tamarix Pallasii*, *Atraphaxis lanceolata*, *Nitraria Schoberi*, *Haloxylon Regelii?*, *Ephedra* sp., *Artemisia campestris*, *Arnebia guttata*, *Arnebia fimbriata* n. sp., *Statice aurea*; изрѣдка попадался и ревенъ (*Rheum leucorhizum*) съ сѣменами, совершенно сгорѣвшими отъ солнца. Но весьма замѣчательною находкою здѣсь былъ новый видъ хармыка, названный извѣстнымъ нашимъ ботаникомъ К. И. Максимовичемъ—*Nitraria sphaerocarpa*. Этотъ густовѣтвистый кустарникъ, вышиною въ полтора фута, былъ усыпанъ бѣловатыми прозрачными ягодами, величиною съ крупную горошину; внутри онѣ пустыя и состоятъ лишь изъ продолговатаго сухого зерна, окруженнаго тонкою, какъ бумага, оболочкою.

Животная жизнь горъ Бэй-сянь, равно какъ и всей Хамійской пустыни, крайне бѣдная. Даже ящерицъ и тѣхъ сравнительно не много; между ними найдены: *Prhynoccephalus* sp., та же, что въ Хами, и *Stellio* sp.

Изъ звѣрей здѣсь встрѣчались только зайцы (*Lepus* sp.), *хара-сульта* (*Antilope subgutturosa*), изрѣдка *куланы* <sup>1)</sup>, а также *дикие верблюды*, ко-

<sup>1)</sup> Какой видъ—не знаю; не добыли. Издали же невозможно отличить *онагра* (*Asinus onager*) отъ *киама* (*Asinus kiang*).