

Впрочемъ, весь почти средній поясъ Нанъ-шаня, въ описываемой части его сѣвернаго склона, несетъ пустынный характеръ. Почва горъ этого пояса, лежащаго приблизительно между 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—11 тысячъ футовъ абс. выс., состоитъ исключительно изъ лёссово́й глины и мелкой гальки; въ послѣдней часто встрѣчаются сильно округленные гранитные валуны. Скаль очень мало; онѣ состоятъ изъ сіенита, сѣраго гнейса и темнаго глинистаго сланца; кой гдѣ попадаетъ бѣлый мраморъ. Горные скаты вездѣ очень круты; мѣстами, въ узкихъ ущельяхъ, почти отвѣсны. Вообще описываемый поясъ Нанъ-шаня несетъ весьма дикій характеръ и трудно доступенъ. Орошеніе его, вслѣдствіе сухости климата, очень бѣдное. Эта то причина обусловливаетъ, главнымъ образомъ, отсутствіе лѣсовъ и скудость флоры вообще.

Средній по-  
ясъ сѣвернаго  
склона описы-  
ваемыхъ горъ.

Всего бѣднѣе и однообразнѣе эта флора по вышеупомянутымъ вы-сокимъ равнинамъ. Ихъ глинистая почва нигдѣ не прикрыта зеленымъ ковромъ; наоборотъ, равнины эти издали кажутся совершенно сѣрыми. Скудная растительность обыкновенно разсажена здѣсь рѣдкими кустиками. Только повыше, въ сосѣдствѣ альпійскаго пояса, становится немного лучше. Здѣсь въ большомъ количествѣ появляются мелкая *полынъ* (*Artemisia pectinata*) и *ковыль* (*Stipa* sp.). Изъ другихъ же растеній, свойственныхъ описываемымъ равнинамъ, можно назвать только представителей пустынной флоры: *бударгану* (*Kalidium gracile*), *Reaumuria songarica*, *Reaumuria trigyna* n. sp. и кой гдѣ *дырисунъ* (*Lasiagrostis splendens*). Не богаче растительность и на горныхъ скатахъ средняго пояса Нанъ-шаня. Тамъ, на глинистой, также большею частію оголенной почвѣ, въ разсыпную растутъ вышеназванные невзрачные представители флоры, къ которымъ прибавляются: *Salsola abrotanoides* n. sp., *Sympegma Regelii*, *Tanacetum* sp., изрѣдка *Astragalus monophyllus*, а повыше на лучшихъ мѣстахъ *курульскій чай* (*Potentilla fruticosa*) и *кинецъ* (*Festuca* sp.).

Его флора.

По горнымъ долинамъ, въ особенности тамъ, гдѣ бѣгутъ рѣчки, растительность, какъ и слѣдуетъ ожидать, разнообразнѣе. Здѣсь встрѣчаются, хотя и въ небольшомъ числѣ, кустарники: *чагеранъ* (*Hedysarum multijugum*, n. sp.), изрѣдка попадающійся и по горамъ почти до 11 тысячъ фут. абс. выс.; *тамарискъ* (*Tamarix elongata*?); *хармыкъ* (*Nitraria Schoberi*), который на этой высотѣ въ началѣ іюля еще только цвѣтетъ; красивый *сабельникъ* (*Comarum Salessowii*); *Caryopteris mongolica*, растущая также и въ пустынѣ Ала-шаньской; наконецъ кой-гдѣ *тальникъ* (*Salix* sp.) и *облениха* (*Hippophaë rhamnoides*), поднимающіеся лишь до 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> тысячъ фут. абс. выс.; *ломоносъ* (*Clematis orientalis*) нерѣдко обви-ваетъ эти кустарники и покрываетъ ихъ густою шапкою своихъ жел-