

луговъ, залегающихъ между этихъ скалъ, преобладаютъ другія растенія: *кинецъ* (*Festuca* sp.) обыкновенный и въ верхней области долинъ средняго пояса горъ; превосходно пахучая *Sterigma sulfureum*, дикій *лукъ* (*Allium Szovitsi*) и ярко-желтая *скерда* (*Crepis Pallasii*); изъ кустарниковъ же — *курульскій чай* (*Potentilla fruticosa*) и низкій колючій *Oxytropis tragacanthoides* съ лиловыми и розовыми цвѣтками.

Поясъ каменныхъ розсыпей.

Выше 12¹/₂ тысячъ фут. абс. выс., луга альпійскаго пояса начинаютъ быстро бѣднѣть и чѣмъ далѣе вверхъ, тѣмъ болѣе и болѣе замѣняются голыми каменными розсыпями, которыя вскорѣ вытѣсняють всякую растительность и сплошь покрываютъ собою горы до самыхъ вѣчныхъ снѣговъ. Крайній предѣлъ растительности на сѣверномъ склонѣ снѣгового хребта Гумбольдта лежитъ на абс. высотѣ 13,700 фут. ¹⁾. Последними представителями растительной жизни мы нашли здѣсь: *камнеломку* (*Saxifraga* n. sp.), *Saussurea sorocephala*, *Pyrethrum* sp. и *Thylacospermum* n. sp.; послѣдній растетъ небольшими кочковидными массами и поднимается даже на нѣсколько сотъ футовъ выше означеннаго для растительности предѣла. Всѣ эти растенія составляютъ обыденныя формы въ нижнихъ частяхъ розсыпей, тамъ, гдѣ эти розсыпи перемеживаются съ альпійскими лугами, т. е. приблизительно въ полосѣ отъ 12—13¹/₂ тыс. футовъ абс. выс. Въ нижней части этого пояса, слѣдовательно въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ настоящими альпійскими лугами, встрѣчается довольно разнообразная горная флора. Кромѣ четырехъ вышеупомянутыхъ видовъ растеній, здѣсь обыкновенны: *ревень* (*Rheum spiciforme* var.), стелющій по землѣ кружками свои некрупные листья и едва поднимающій изъ нихъ цвѣточные стебли; *хохлатка* (*Corydalis stricta?*), красиво пестряющая между камнями кучами своихъ желтыхъ цвѣтовъ; *очитокъ* (*Sedum quadrifidum*), обыкновенный спутникъ здѣшнихъ горъ; *альпійская астра* (*Aster alpinus*); *Werneria nana*, найденная и на Гималаѣ; мелкій лилово-бѣлый *горошекъ* (*Oxytropis* sp.); миниатюрная *василистникъ* (*Thalictrum alpinum*) и *валериана* (*Valeriana Jaeschkei?*); *мытникъ* (*Pedicularis pilostachya*, n. sp.), съ темно-вишневыми цвѣтами; мохнатая крупная *Saussurea* n. sp.; растущій обыкновенно по скаламъ *Isopyrum grandiflorum*, довольно впрочемъ здѣсь рѣдкій; *Physolychnis alaschanica*, *Arenaria formosa*, *Anaphalis Hancockii*, n. sp., *Draba alpina* var. *algida*, *Leontopodium alpinum*.

Эти растенія проводятъ свою кратковременную жизнь, повидимому, въ самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ: тѣсняются подъ камнями, или

¹⁾ На южномъ склонѣ тѣхъ же горъ предѣлъ растительности лежитъ на абс. выс. 15,000 фут. Объ этомъ будетъ говорено въ слѣдующей главѣ.