

Притомъ здѣсь, т. е. на южномъ склонѣ описываемыхъ горъ, вѣчнаго снѣга гораздо меньше, нежели на ихъ склонѣ сѣверномъ.

Объ вышеприведенныя цифры могутъ быть приняты и за среднюю высоту снѣговой линіи хребта Гумбольдта, такъ какъ здѣшніе ледники, при ихъ близкомъ сосѣдствѣ съ высокими обширными долинами, маломъ пополненіи атмосферными осадками и быстромъ таяніи лѣтомъ въ сухомъ воздухѣ на жгучемъ солнцѣ этой широты—едва ли могутъ продвигаться значительно ниже снѣговой линіи. Такое явленіе, вѣроятно, общее и для всего сѣв. Тибета.

Фауна альпій-
ской области.

Животная жизнь альпійскаго пояса са-чжеусскаго Нанъ-шаня вообще небогатая, можно даже сказать бѣдная, сравнительно съ фауною (въ особенности орнитологической) Куку-норскихъ горъ, или съ обиліемъ звѣрей въ сѣв. Тибетѣ. Но въ Нанъ-шанѣ являются уже представители млекопитающихъ, свойственныхъ исключительно Тибету. Они находятъ здѣсь, подобно тому, какъ и въ лобъ-норскомъ Алтынъ-тагѣ, сѣверную границу своего географическаго распространенія. Изъ крупныхъ тибетскихъ звѣрей въ альпійской области описываемыхъ горъ водятся *куку-яманъ* (*Pseudois Nahoog*) и *дикій якъ* (*Roephagus mutus* n. sp.)¹⁾. Первый изъ нихъ держится исключительно въ каменныхъ розсыпяхъ и довольствуется маленькими площадками скудной растительности. Дикіе же яки, всегда требующіе прохлады, лѣтомъ уходятъ къ вѣчнымъ снѣгамъ, но зимою спускаются въ болѣе теплый и менѣе снѣжный средній поясъ горъ. Затѣмъ, на альпійскихъ лугахъ Нанъ-шаня живетъ *аркаръ* (*Ovis* sp.), убить котораго для опредѣленія вида намъ не удалось. Здѣсь же, т. е. въ альпійской области, не смотря на ея безлѣсность, водится *маралъ* (*Cervus albirostris*, n. sp.), представляющій собою новый видъ²⁾. Далѣе въ альпійскомъ поясѣ Нанъ-шаня держится *медвѣдь* (*Ursus* sp.), нами также недобытый. Медвѣдь этотъ питается отчасти *сурками* (*Arctomys Roborowskii*, n. sp.), норы которыхъ мѣстами весьма здѣсь многочисленны.

Изъ другихъ млекопитающихъ по альпійскимъ лугамъ много *зайцевъ* (*Lepus* sp.); изрѣдка бродятъ *волки* (*Canis chanko?*). Изъ мелкихъ грызуновъ обыкновенны два вида *мышей* (*Lagomys*): одинъ изъ нихъ живетъ въ норахъ по лугамъ, а другой въ каменныхъ розсыпяхъ.

¹⁾ Объ этихъ звѣряхъ не одинъ еще разъ будетъ упоминаться впоследствии. Рисунокъ дикаго яка помѣщенъ въ IX главѣ. Подробное же описаніе характера и образа его жизни см. «Монголія и страна Тангутовъ» 1875 г. Т. I, стр. 311—321. О куку-яманѣ, правда ала-шаньскомъ (*Pseudois Burghel*), но весьма близкомъ къ описываемому, рассказано въ той же книгѣ стр. 174—179.

²⁾ Объ этомъ маралѣ рассказано въ слѣдующей главѣ, тамъ же помѣщенъ и его рисунокъ.