

На такихъ болотахъ растутъ европейскіе знакомцы: *ситовникъ* Его флора. (*Scirpus maritimus* var. *affinis*), *осока* (*Carex* sp.), *тростникъ* (*Phragmites communis*), *водяная сосенка* (*Hippuris vulgaris*), *пузырчатка* (*Utricularia vulgaris*); изрѣдка *кука* (*Typha stenophylla*); по окраинамъ же мѣстами изобилень *колосникъ* (*Elymus junceus*).

Берега рѣкъ почти всегда сопровождаются узкою полосой кустарниковъ, но только трехъ видовъ; изъ нихъ преобладаютъ: *балamoto* (*Muricaria alopecuroides*) и *хармыкъ* (*Nitraria Schoberi*); болѣе рѣдокъ *сулакъ* (*Lycium turcomanicum*). Затѣмъ эти кустарники обыкновенно исчезаютъ, лишь только рѣчка выбѣгаетъ подальше отъ горъ.

Въ пространствахъ между орошенными, сравнительно весьма небольшими, мѣстностями разстилается бесплодная пустыня. Иногда на многіе десятки верстъ почва совершенно оголена; также голы и всѣ здѣсь горы. Только на солончакахъ встрѣчаются уродливые кусты *бударганы* (*Kalidium gracile*, *Sympegma Regelii*), невзрачныя *солянки* (*Salsola Kali*, *Salsola* n. sp., *Halogeton* sp., изрѣдка *Kochia mollis*), а тамъ, гдѣ почва дѣлается глинисто-песчаною, появляются: *бѣлолозникъ* (*Eurotia ceratoides*), кустарный *чернобыльникъ* (*Artemisia campestris*), *Artemisia* n. sp., *Atraphaxis lanceolata*, *Reaumuria songarica*, *Tanacetum* sp.; кой-гдѣ *Reaumuria trigina* n. sp. и *Oxytropis aciphylla*.

Царство животныхъ сѣвернаго Цайдама также весьма бѣдное. Здѣсь Фауна. нѣтъ вовсе ни рыбъ, ни земноводныхъ. Для первыхъ—рѣчки слишкомъ быстры и мелки; для послѣднихъ—болота солёны.

Среди млекопитающихъ встрѣчаются только два представителя сѣверно-тибетской фауны: *хуланъ* (*Asinus Kiang*) и *пищуха* (*Lagomys ladaensis*); оба свойственные также степямъ Куку-нора. Въ пескахъ восточной части Сыртынской равнины (въ урочищѣ Куку-сай) и близъ озера Хуйтунъ-норъ водятся *дикіе верблюды*. Затѣмъ обыкновенны: *харасульта* (*Antilope subgutturosa*), *заяцъ* (*Lepus* sp.), *волкъ* (*Canis lupus*), *лисица* (*Canis vulpus*) и *полевка* (*Arvicola* sp.); рѣже попадаются: *песчанка* (*Meriones* sp.), *тушканчикъ* (*Dipus* sp.) и *Myodes* sp. Всего вообще въ Цайдамѣ, какъ въ сѣверномъ, такъ и южномъ, нами найдено было только 15 видовъ млекопитающихъ, кромѣ домашнихъ.

Орнитологическая фауна описываемой страны можетъ похвалиться бѣльшимъ разнообразіемъ. За оба путешествія ¹⁾ мы наблюдали въ Цай-

¹⁾ Первое — въ ноябрѣ 1872 г. и февралѣ 1873 г.; второе — въ августѣ 1879 г., январѣ и февралѣ 1880 г.