

дамѣ (сѣверномъ и южномъ) 97 видовъ птицъ ¹⁾. Впрочемъ, если исключить крайнія горы, то число это значительно уменьшится.

По своему характеру цайдамская орнитологическая фауна гораздо болѣе сходствуетъ съ монгольской, нежели съ сѣверно-тибетскою, и рѣзко отличается отъ фауны сосѣднихъ Куку-норскихъ горъ, не говоря уже о лѣсной области восточнаго Нань-шаня (горъ Гань-су). Своего собственного представителя птицъ Цайдамъ имѣетъ только одного ²⁾, именно *фазана* (*Phasianus Vlangalii*), весьма обыкновеннаго по тростниковымъ зарослямъ южной половины этой страны.

Къ характерному явленію по части цайдамской орнитологіи можно указать еще на то, что на тамошнихъ болотахъ, не смотря, повидимому, на полную ихъ пригодность, вовсе не гнѣздятся ни утки, ни гуси, да и на осеннемъ пролетѣ (за исключеніемъ турпановъ) попадаютъ въ этихъ мѣстахъ весьма рѣдко.

Изъ осѣдлыхъ птицъ сѣв. Цайдама наиболѣе обыкновенны: *саксаульная сойка* (*Podoces Hendersoni*), *воронъ* (*Corvus corax*), *тибетскій жаворонокъ* (*Melanocorypha maxima*), *жаворонокъ чернолобый и малый* (*Otocoris nigrifrons*, *Calandrella brachidactyla?*), *больдурукъ* (*Syrrhaptes paradoxus*).

Осенній пролетъ, наиболѣе здѣсь сильный во второй половинѣ августа и въ началѣ сентября, былъ вообще далеко необилень. Нами отмѣчено за это время только 29 пролетныхъ видовъ, изъ которыхъ въ ббльшемъ количествѣ встрѣчались: *плисцы* (*Motacilla baikalensis*, *Budytes citreola*, *Calobates boarula*), *славки* (*Silvia curruca*), *стрижи* (*Cypselus murarius*), *удоды* (*Upupa epops*), *сорокопуты* (*Lanius isabellinus*), *турпаны* (*Casarca rutila*), *ржанки* (*Charadrius xanthocheilus*), *кулички-воробьи* (*Tringa Temminckii*) и *кулички-красноножки* (*Totanus calidris*); послѣдніе въ большомъ числѣ также гнѣздятся на сѣверно-цайдамскихъ болотахъ.

Равнина
Сыртынъ.

Наиболѣе обширное изъ этихъ болотъ раскидывается въ равнинѣ *Сыртынъ* ³⁾, представляющей собою лучшее мѣсто во всемъ сѣверномъ Цайдамѣ. Строго говоря, равнина эта, носящая въ своей восточной части названіе *Куку-сай*, принадлежитъ Нань-шаню и составляетъ пе-

¹⁾ Распредѣляющихся приблизительно слѣдующимъ образомъ: осѣдлыхъ—28 видовъ; пролетныхъ—56 (изъ нихъ около 17 остаются гнѣздиться); зимующихъ—13 видовъ.

²⁾ Или, быть можетъ, двухъ, если при специальной обработкѣ орнитологическаго отдѣла, окажется новымъ найденный на болотахъ сѣв. Цайдама жаворонокъ, котораго, въ такомъ случаѣ, можно назвать *Alaudula zaidamensis*.

³⁾ Монгольское названіе «Сыртынъ» обозначаетъ вообще сырое или болотистое мѣсто.