

реходъ отъ него къ Цайдаму. Въ западной ея части, т. е. собственно въ Сыртынь, лежатъ два большихъ соляныхъ озера: *Бага-Сыртынъ-норъ* (малое Сыртынское озеро) и *Ихэ-Сыртынъ-норъ* (большое Сыртынское озеро). Последнее, какъ само названіе показываетъ, больше перваго; но посѣтить его намъ не удалось. Мы были только на оз. Бага-Сыртынъ-норъ, которое расположено въ западной окраинѣ большого ключевого болота, образуемаго подземною водою, сбѣгающею вѣроятно со снѣговой группы Анембаръ-ула, съ хребтовъ Гумбольдта и Риттера. Въ самомъ низкомъ мѣстѣ равнины, раскинувшейся между вышеназванными горами, вода, доставляемая почвѣ ручьями и рѣчками, бѣгущими отъ снѣговъ, снова выходитъ на поверхность въ видѣ многочисленныхъ прѣсныхъ ключей. Въ промежуткахъ между ними залегаютъ, обыкновенно въ небольшихъ ямкахъ, отложенія соли, слоями отъ 2—4 дюймовъ толщины. Соль эта чисто бѣлая и отличнаго вкуса. На оз. Бага-Сыртынъ-норъ, по крайней мѣрѣ въ восточной его части, соляныхъ отложеній нѣтъ; здѣсь даже вода почти прѣсная, такъ какъ она постоянно обновляется ключевыми ручейками. На противоположномъ же западномъ берегу видны голые солончаки; тамъ, быть можетъ на днѣ самаго озера, залегаютъ отложенія соли.

Въ восточной части Сыртынскаго болота соляныхъ отложеній мало, поэтому и травянистая растительность гораздо лучше. Ея представителями служатъ немногочисленные виды, общіе всѣмъ сѣверно-цайдамскимъ болотамъ; по окраинамъ же, на влажной глинисто-песчаной почвѣ, въ изобиліи растеть *колосникъ* (*Elymus junceus*). Здѣсь пасутся многочисленныя стада *хулановъ*; обильны и *хара-сульты*. Изъ птицъ на болотахъ Сыртына мы встрѣтили много только *куликовъ-красноножекъ* (*Totanus calidris*), которые, не смотря на августъ, все еще возились съ своими дѣтьми и съ тревожнымъ крикомъ преслѣдовали охотника. Кромѣ того, обыкновенны были: *крачки* (*Sterna hirundo*), *плисицы* (*Budytes citreola*) и *кулички* (*Tringa Temminckii*, *Aegialites cantianus*); изрѣдка попадались *журавли* (*Grus nigricollis*), которые здѣсь гнѣздятся. Изъ мѣстныхъ видовъ преобладали *жаворонки*: *малый* (*Calandrella brachydactyla?*), *чернолобый* (*Otocoris nigrifrons*) и *тибетскій* (*Melanocorypha maxima*). Этотъ послѣдній, впервые здѣсь появившійся, какъ извѣстно, самый большой между всѣми своими собратьями—ростомъ съ крупнаго дрозда; поетъ громко и хорошо.

Абсолютная высота оз. Бага-Сыртынъ-норъ равняется 9,600 футамъ. Цифру эту можно принять за среднюю и для всей Сыртынской равнины, которая, въ восточной своей половинѣ, именуемой, какъ выше