

кустарникъ все болѣе и болѣе становится рѣдокъ и мельчаетъ въ своихъ размѣрахъ; выше 47° сѣв. широты въ собственной Гоби не распространяется ¹⁾).

Растетъ хармыкъ на влажной, глинисто-соленой почвѣ, чаще въ разсыпную, нежели густыми зарослями. По внѣшней формѣ, это кустарникъ корявый, густовѣтвистый, ростомъ въ 2—3 фута; но въ Цайдамѣ и въ долинѣ верхней Хуань-хэ достигаетъ вышины отъ 5—7 футовъ, и выглядываетъ гораздо стройнѣе.

Цвѣтетъ хармыкъ обыкновенно въ маѣ, въ началѣ или въ концѣ этого мѣсяца, смотря по мѣстности. Небольшіе, собранные въ кисти, бѣлые цвѣтки густо усыпаютъ всѣ вѣтви. Также изобильны и ягоды, по величинѣ и формѣ отчасти напоминающія черную смородину. Поспѣваютъ эти ягоды въ концѣ августа и въ первой половинѣ сентября; но висятъ долго, даже послѣ того, какъ опадутъ листья ²⁾). Цвѣтомъ ягоды хармыка бываютъ красныя, темно-вишневая и даже почти черныя, вѣроятно, по степени зрѣлости. Впрочемъ въ южномъ Алашанѣ мы встрѣчали, какъ исключенія, зрѣлыя ягоды описываемаго растенія розоваго и розовато-палеваго цвѣта. Вкусъ всѣхъ этихъ весьма сочныхъ ягодъ сладко-соленый; примѣсь соли бываетъ то въ бѣльшей, то въ меньшей степени, смотря по мѣстности и качеству почвы. Быть можетъ, подъ вліяніемъ культуры, хармыкъ исподволь совершенно потерялъ бы свою соленость; тогда эти ягоды сдѣлались бы вполне пригодными для ѣды. Но и теперь ими не брезгаютъ монголы. Для обитателей же Цайдама хармыкъ составляетъ важное подспорье къ пищѣ: его собираютъ осенью и сушатъ впрокъ на зиму. Въ такомъ видѣ хармыкъ ѣдятъ, обыкновенно подмѣшивая къ дзамбѣ и предварительно сваривши; кромѣ того, пьютъ сладко-соленый отваръ.

Верблюды также весьма любятъ ягоды хармыка. Кромѣ того, въ Цайдамѣ имъ питаются многія мѣстныя птицы ³⁾), не исключая даже воронъ; волки, лисицы и медвѣди, также усердно поѣдаютъ хармыкъ; имъ питаются даже ящерицы. Медвѣди, для подобной лакомой пищи, ежегодно осенью спускаются изъ Тибета въ южный Цайдамъ и проводятъ здѣсь мѣсяць или два, спеціально занимаясь пожираниемъ ягодъ хармыка.

¹⁾ Въ Алтаѣ хармыкъ поднимается нѣсколько выше на сѣверъ.

²⁾ Впрочемъ такую особенность мы замѣтили лишь на цайдамскомъ хармыкѣ; въ Гоби ягоды этого растенія опадаютъ вскорѣ послѣ ихъ созрѣванія.

³⁾ Замѣчательно, что перелетныя птицы, даже дрозды, большею частію не ѣдятъ ягодъ хармыка, или ѣдятъ его неохотно, по нуждѣ.