

*Ekloni* <sup>1)</sup>. Наконецъ, изъ отряда однокопытныхъ сѣв. Тибету свойственъ *хуланъ* (*Asinus Kiang*), пасущійся большими табунами по горнымъ долинамъ <sup>2)</sup>.

Вотъ и всѣ представители здѣшнихъ дикихъ млекопитающихъ. Къ нимъ можно прибавить только 5 видовъ домашнихъ животныхъ, содержаемыхъ кочевниками на Тань-ла и далѣе къ югу. Изъ этихъ животныхъ всего болѣе разводятся *яки* <sup>3)</sup> и *бараны*; въ меньшемъ числѣ содержатся *козы* и *лошади*; *собака*, какъ и вездѣ, слѣдуетъ за человѣкомъ.

Относительно птицъ сѣв. Тибетъ еще бѣднѣе, нежели относительно млекопитающихъ. У послѣднихъ малое количество видовъ вознаграждается массою индивидуумовъ, но среди пернатыхъ обитателей описываемой страны подобнаго богатства не встрѣчается. Всего нами найдено собственно на сѣв. тибетскомъ плато 51 видъ птицъ, слѣдующимъ образомъ распредѣляющихся по отрядамъ и по образу жизни:

	Осѣдлыя.	Пролетныя.	Зимующія.
<i>Хищныя</i> ( <i>Accipitres</i> ) . . . . .	7	9	3
<i>Воробьиныя</i> ( <i>Passeres</i> ) . . . . .	9	9	—
<i>Кричащія</i> ( <i>Oscines</i> ) . . . . .	—	—	—
<i>Голубиныя</i> ( <i>Columbae</i> ) . . . . .	1	—	—
<i>Куриныя</i> ( <i>Gallinae</i> ) . . . . .	2	—	—
<i>Голенастыя</i> ( <i>Grallatores</i> ) . . . . .	—	6	—
<i>Водяныя</i> ( <i>Natatores</i> ) . . . . .	—	5	—
Всего . . . . .	19	29	3

Затѣмъ сюда, пожалуй, можно прибавить, хотя и съ натяжкой 15 видовъ, наблюдавшихся нами только въ горной окраинѣ, къ Цайдаму, т. е. въ хребтахъ Бурханъ-Будда, Го-шили, Толай и Торай <sup>4)</sup>. Изъ этихъ видовъ: 6 осѣдлыхъ, 2 пролетныхъ и 7 зимующихъ. Правда, наши орнитологическія изслѣдованія въ сѣв. Тибетѣ производились только осенью и зимою; слѣдовательно, мы не могли наблюдать птицъ, здѣсь гнѣздящихся и являющихся на весеннемъ пролетѣ; но, по всему вѣроятію, число тѣхъ и другихъ весьма ограничено.

<sup>1)</sup> При неимѣніи экземпляра для опредѣленія вида — ошибочно названъ *Canis corsak* въ моей «Монг. и стр. Тангутовъ», т. I, стр. 329; тамъ же описанъ и образъ жизни этой лисицы.

<sup>2)</sup> Описаніе образа жизни хулана см. «Монголія и страна Тангутовъ», т. I, стр. 282—285.

<sup>3)</sup> Обыкновенно рогатаго скота въ сѣв. Тибетѣ нѣтъ — его замѣняетъ якъ.

<sup>4)</sup> Сѣверный склонъ ниже указываемой горной сѣв. тибетской окраины, по характеру своей орнитологической фауны, отличенъ отъ самаго плато и, правильнѣе, долженъ быть отнесенъ къ Цайдаму, въ особенности къ сѣверному.