

Наибольше характерными представителями орнитологической фауны на сѣв. Тибетскомъ плато служатъ: *грифы* (*Gypaetus barbatus*, *Vultur monachus*, *Gyps himalayensis*), *воронъ* (*Corvus corax*), *клушица* (*Fregilus graculus*), *тибетскій жаворонокъ* (*Melanocorypha maxima*), живущіе въ норахъ *выорки* (*Onychospiza Taczanowskii*, *Pyrgilauda ruficollis*, *Pyrgilauda barbata* n. sp.) и *Podoces humilis*; голубейъ одинъ только видъ—именно *голубь каменный* (*Columba rupestris*); куриныхъ всего два вида: *тибетскій уларъ* (*Megaloperdix thibetanus*) и *тибетскій больдурукъ* (*Syrrhaptes thibetanus*); голенастыя и водяныя наблюдались нами только на осеннемъ пролетѣ, да и то въ маломъ количествѣ.

Причины бѣдности орнитологической фауны сѣв. Тибета заключаются, конечно, въ исключительности и при томъ крайней невыгодности тѣхъ физико-географическихъ условій, которыя представляетъ эта страна для ея пернатыхъ обитателей. Здѣсь нѣтъ ни лѣсовъ, ни травяныхъ зарослей, обильныхъ кормомъ, удобныхъ какъ для жительства, такъ и для вывода молодыхъ. Берега сѣв. тибетскихъ рѣкъ вездѣ голые, открытые, да при томъ въ озерахъ, большею частію соленыхъ, только изрѣдка водится рыба<sup>1)</sup>; горные же хребты бѣдны скалами, въ которыхъ обыкновенно держатся альпійскіе виды птицъ. Ко всему этому присоединяется огромная абсолютная высота и, какъ результатъ ея, невыгодныя климатическія условія. Словомъ, сумма неблагоприятныхъ вліяній настолько велика, что, не смотря на обширность пройденнаго нами по сѣв. тибетскому плато пространства, мы нашли здѣсь только 19 осѣдлыхъ видовъ пернатыхъ. Да и едва ли число это удвоится, на всемъ протяженіи отъ нашего пути къ западу до Каракорума.

Даже пролетныя птицы спѣшатъ безъ оглядки перенестись черезъ сѣв. Тибетъ; только нѣкоторые хищники остаются здѣсь на время осенью, находя въ безчисленныхъ пищухахъ (*Lagomys ladacensis*?) обильную для себя пищу. Но и это обстоятельство, играющее важную роль въ выборѣ мѣста зимовки, не соблазняетъ этихъ хищниковъ остаться на зиму въ сѣв. Тибетѣ. Главная ихъ масса все таки пролетаетъ далѣе къ югу—на Брампутру, или, быть можетъ, за Гималай; остаются лишь три вида—*Archibuteo aquilinus*, *A. strophiatus*? *Falco sacer*<sup>2)</sup>, да и то въ самомъ ограниченномъ числѣ экземпляровъ. Сильныя голенастыя, именно жу-

<sup>1)</sup> По пути пундита Нанинъ-Синга встрѣчены имъ были только три рыбныхъ озера: *Данра-юмъ-чо*, *Кіаринъ-чо* и *Тенри-норъ*. На двухъ первыхъ, по словамъ пундита, множество водяныхъ птицъ—вѣроятно, по большей части, пролетныхъ, такъ какъ эти озера посѣщены были пундитомъ во время осени.

<sup>2)</sup> *Falco sacer*—встрѣчена была только одна пара на Танъ-ла.