

равли (*Grus sinerea*, *G. virgo*), по крайней мѣрѣ осенью, огромными стадами и въ одинъ махъ переносятся черезъ сѣв. Тибетъ; отчасти пролетаютъ здѣсь въ это время года и водяныя птицы. Мелкія же пташки, въ особенности лѣсныя, по всему вѣроятію, облетаютъ высокое нагорье и слѣдуютъ болѣе восточнымъ путемъ.

За всю осень, правда уже позднюю¹⁾, нами наблюдалось на сѣв. тибетскомъ плато 29 пролетныхъ видовъ птицъ. Но можно съ достаточнымъ вѣроятіемъ предположить, что весенній пролетъ бываетъ здѣсь еще бѣднѣе, такъ какъ климатическія условія въ ту пору года, т. е. весною, несравненно хуже, нежели во время осени. Лѣтомъ на сѣв. тибетскомъ плато, по всему вѣроятію, гнѣздятся, кромѣ осѣдлыхъ, также лишь немногіе степные и горные виды пернатыхъ.

Лучшія условія относительно зимовки, и вообще жительства птицъ, представляетъ горная окраина высокаго тибетскаго плато къ сторонѣ Цайдама. На сѣв. склонѣ этой окраины, развивающемся грандіозными альпійскими формами, въ глубокихъ долинахъ, орошенныхъ быстрыми рѣчками, берега которыхъ поросли густымъ кустарникомъ *Muricaria*, изобилуютъ ключами и кой гдѣ сносными лужайками, въ этихъ сравнительно крохотныхъ уголкахъ находятъ для себя тихій пріютъ нѣкоторые осѣдые и зимующіе виды, не встрѣчающіеся на самомъ плато. Изъ осѣдлыхъ наиболѣе обыкновенны: *стѣнолазъ* (*Tichodroma muraria*), *завирушка* (*Accentor fulvescens*), *скалмстая куропатка* (*Caccabis magna*), а изъ зимующихъ: *вьюрки* (*Leucosticte haematopygia*, *Montifringilla Adamsi*), скопляющіеся огромными стадами и *бекас-отшельникъ* (*Scelopax solitaria*), въ одиночку попадающійся на уединенныхъ ключахъ.

Позднее время года помѣшало намъ изслѣдовать пресмыкающихся и земноводныхъ сѣв. тибетскаго плато. Только однажды, въ началѣ октября, мы встрѣтили здѣсь на абс. выс. болѣе 14,000 фут.²⁾ одинъ видъ маленькой *ящерицы* (*Rhynocerosphalus* sp.), найденной впоследствии въ долинѣ верхней Хуань-хэ и въ пустынѣ Гоби, близъ горъ Хурху. Во всякомъ случаѣ этимъ классомъ животныхъ сѣв. Тибетъ, безъ сомнѣнія, крайне бѣденъ.

Что же касается до рыбъ, то, въ рѣкахъ и рѣчкахъ описываемой Рыбы. страны, онѣ водятся въ достаточномъ обилии. Въ р. Номохунь-голь (въ горной окраинѣ къ Цайдаму) добыты нами были *губачи* (*Diplorhysa* n. sp.) и *вьюнки* (*Nemachilus* n. sp.); послѣдніе, быть можетъ, также по-

¹⁾ Съ 20-го сентября.

²⁾ Шлагинвейтъ встрѣчалъ въ западномъ Тибетѣ ящерицъ и змѣй на абс. выс. 15,200 фут.