

Свѣдѣнія объ этихъ горахъ уже были напечатаны въ описаніи
перваго моего путешествія по Центральной Азій¹⁾. Теперь могу при-
бавить только, что и по новому пути, нами здѣсь пройденному, хребетъ
Бурханъ-Будда оказался такъ же дикъ и такъ же бесплоденъ. Подобный
характеръ несомнѣнно сохраняется и на всемъ протяженіи этихъ горъ.

Хребетъ
Бурханъ-Будда
и ущелье р.
Номохунъ-
голь.

Ущелье Номохунъ-гола почти сплошь обставлено громадными остро-
конечными скалами мелкозернистаго грюнштейна. Сама рѣка въ своемъ
среднемъ теченіи имѣетъ отъ 5—7 сажень ширины, при глубинѣ (въ
малую воду) отъ 1—2 футовъ; въ низовьи ширина и глубина увели-
чиваются. Въ горъ, Номохунъ-голь вырылъ себѣ въ лёссовой и нанос-
ной (галечной) почвѣ довольно глубокое траншееобразное русло. Мѣстами
такіе обрывистые берега встрѣчаются также въ среднемъ и верхнемъ
теченіи описываемой рѣки. Тамъ, гдѣ ущелье ея немного расширяется,
берега густо обрастаютъ весьма похотимъ на тамарискъ, и называемымъ
монголами *бала-мото* (*Murgaria alopercuroides*), кустарникомъ, который
поднимается до 13,000 фут. абс. выс. Кромѣ этого преобладающаго
вида, по ущелью Номохунъ-гола растутъ: *лоза* (*Salix* sp.) и *суакъ* (*Ly-
cium turcomanicum*); попадаются также — *сабельникъ* (*Comarum Salessowii?*),
низкорослая ($1\frac{1}{2}$ —2 фут.) *облепиха* (*Hippophaë rhamnoides*) и вьющійся
ломоносъ (*Clematis orientalis*).

Въ этихъ кустарныхъ заросляхъ, обильныхъ ключами, намъ встрѣ-
чались пролетныя и частію осѣдлыя птицы: *завирушка* (*Accentor
fulvescens*), *Ала-шаньская горихвостка* (*Ruticilla alaschanica*), *дрозды*
(*Turdus ruficollis?*), *плисцы* (*Motacilla baikalensis?*), *Немира суа-
нуга*, *Leptopoeile Sophiae*, *оляпка* (*Cinclus sordidus*) и *бекасъ-от-
шельникъ* (*Scolopax solitaria*). Замѣчено было также нѣсколько боль-
шихъ стадъ сѣрыхъ *журавлей* (*Grus sinerea*), которые высоко въ обла-
кахъ слѣшили прямо на югъ и, по всему вѣроятію, въ одинъ махъ
пролетѣли черезъ сѣв. Тибетъ. Изъ звѣрей, по скаламъ Номохунъ-гола,
много *куку-ямановъ* (*Pseudois Nahoog*); водятся также *медведи* (*Ursus* sp.)
и *аркары* (*Ovis Hodgsoni?*); но послѣдніе, какъ обыкновенно, избѣгаютъ
дикихъ горъ и держатся на южномъ, болѣе мягкомъ, склонѣ Бурханъ-Будда.

Обходомъ по Номохунъ-голу мы сдѣлали лишнихъ 45 верстъ, но, по
правдѣ сказать, мало выгадали относительно удобства пути. Хотя мы
и не переваливали черезъ высокій хребетъ, все-таки путь по ущелью,
нерѣдко каменистому, да при томъ съ частыми переправами съ одного
берега рѣки на другой, достаточно натрудилъ нашихъ верблюдовъ. Не

¹⁾ «Монголія и страна Тангутовъ», Т. I, стр. 303—305.