

выпалъ рано, что, по примѣтамъ цайдамскихъ монголовъ, предвѣщало суровую и снѣжную зиму. Къ счастью нашему, такое предсказаніе исполнилось далеко не вполнѣ.

При переходѣ черезъ хребетъ Шуга я убилъ молодую яловую корову дикаго яка. Мясо оказалось прекраснымъ и очень жирнымъ, такъ что мы почти все забрали съ собою. Шкура же, отлично вылинявшая, поступила въ коллекцію. Но, чтобы не таскать эту шкуру понапрасну, мы закопали ее, вмѣстѣ со шкурою убитаго наканунѣ хулана, въ каменную осыпь на берегу р. Шуга, рассчитывая взять спрятанную кладь при обратномъ слѣдованіи изъ Тибета. Однако, предположеніе это не сбылось, такъ какъ мы вышли впослѣдствіи въ Цайдамъ болѣе западнымъ путемъ. Шкуры же обоихъ звѣрей, какъ слѣдуетъ препарированныя, до сихъ поръ, вѣроятно, покоятся на томъ мѣстѣ, гдѣ мы ихъ положили.

Выйдя на р. *Шуга-голь*, которая, получивъ начало въ горахъ *Урундуши*¹⁾, течетъ вдоль всей южной подошвы хребта Шуга, мы продолжали свое движеніе не прежнимъ (1872—73 гг.) путемъ, къ р. Муръ-усу, при устьѣ Нанчитай-уланъ-мурени, но взяли направленіе болѣе западное и двинулись сначала внизъ по р. Шуга. Эта послѣдняя, на пересѣченіи ея старою нашею дорогою, течетъ на абс. высотѣ 13,700 ф., имѣетъ сажень 6—8 ширины²⁾ и глубину около фута; дно и берега галечные. Верстахъ же въ двадцати ниже, галька замѣняется пескомъ и глиною; при томъ рѣка дѣлается вдвое шире и глубже.

Рѣка Шуга-голь и ея долина.

Увеличенію массы воды способствуютъ многочисленные ключи, разсѣянные по долинѣ обоихъ береговъ средняго теченія р. Шуга. Эти ключи образуютъ здѣсь довольно обширныя болота, покрытыя хорошею кормовою травою. При томъ вся вообще долина имѣетъ луговой характеръ и представляетъ собою лучшее мѣсто, какое приходилось намъ видѣть въ сѣверномъ Тибетѣ. Изъ травъ здѣсь всего болѣе растутъ: низкій (1 ф. вышиною) *ковыль* (*Stipa* sp.), а по ключамъ *водяная со-сенка* (*Hippuris* sp.); затѣмъ *нерѣдки*—*касатикъ* (*Iris* sp.), *астрагалъ* (*Astragalus* sp.), *колосникъ* (*Elymus* sp.), *чеснокъ* (*Allium* sp.), *ломоносъ* (*Clematis orientalis?*), *ревень* (*Rheum spiciforme*), *Stalice* и, небольшими кустиками, какое то бобовое; на солончаковыхъ мѣстахъ встрѣчаются *бударгана* (*Kalidium*) и *Reaumuria*. Изъ кустарниковъ же кой-гдѣ попа-

¹⁾ По разпроснымъ свѣдѣніямъ.

²⁾ Между тѣмъ, зимою 1872—73 гг., р. Шуга имѣла, по накипямъ льда, около 40 сажень ширины. См. «Монголія и страна Тангутовъ», Т. I, стр. 305.