

Растительность, какъ и слѣдуетъ ожидать, вообще бѣдная, хотя лѣтомъ, по всему вѣроятію, довольно разнообразная. Кой-гдѣ и зимою мы встрѣчали здѣсь изсохшія альпійскія формы растеній, каковы: *Saussurea*, *Werneria*, *Anaphalis*, *Allium*; въ укрытыхъ же ущельяхъ попадались даже *кранива* и мелкая *полюнь*.

Но характерную принадлежность относительно флоры какъ горъ Куку-шили, такъ и всѣхъ почти другихъ хребтовъ сѣв. тибетскаго плато составляетъ *тибетская осока* (*Kobresia thibetica* n. sp.), растущая преимущественно на сѣверныхъ склонахъ горъ¹⁾, или въ высокихъ долинахъ и образующая здѣсь обширныя кочковатыя болота, называемыя монголами *мото-ширикъ*. Объ этихъ болотахъ уже было дважды упомянуто въ предыдущей главѣ; теперь скажу только, что своимъ происхожденіемъ онѣ обязаны бурямъ и дождямъ. Послѣдніе доставляютъ въ сѣв. Тибетѣ лѣтомъ въ изобиліи воду, которая застаивается на глинистой почвѣ, поросшей названнымъ растеніемъ, и способствуетъ къ его дальнѣйшему развитію. Затѣмъ, сухою осенью вода эта испаряется, а зимнія и весеннія бури окончательно высушиваютъ и выдуваютъ слой почвы, нескрѣпленный корнями осоки. Такъ, изъ года въ годъ, оригинальныя болота поддерживаются въ своемъ существованіи, а частію и вновь образуются. Онѣ служатъ любимыми пастбищами *дикихъ яковъ*, которыхъ много мы встрѣтили въ горахъ Куку-шили.

Кромѣ того, здѣсь водятся *аркары* (*Ovis Hodgsoni*?), много *тарабагановъ* (*Arctomys* sp.) и *зайцевъ* (*Lepus* sp.). Луговые сѣверные горные склоны изрыты безчисленными норами *пищухъ* (*Lagomys ladacensis*?), за которыми охотятся *кярсы* (*Canis Ekloni* n. sp.), *волки* (*Canis chanko*) и *медвѣди* (*Ursus lagomyiarius* n. sp.). Въ тѣхъ же норахъ живутъ *земляныя выюрки* (*Pyrgilauda rificollis*, *P. barbata* n. sp.) и *Podoces humilis*; по мото-ширикамъ изобильны большіе *тибетскіе жаворонки* (*Melanocorypha maxima*); на розсыпяхъ нерѣдки *уллары* (*Megaloperdix thibetanus*).

Новооткрытый
медвѣдь.

Изъ всѣхъ этихъ звѣрей и птицъ драгоцѣнною для насъ добычею былъ новый видъ медвѣдя, котораго, какъ уже сказано въ IX главѣ, можно назвать *Ursus lagomyiarius*, т. е. *медвѣдь пищухондъ*. Впрочемъ для описываемаго звѣря годится имя и *Ursus hypernemes* (медвѣдь заоблачный), такъ какъ онъ обитаетъ на плоскогорьяхъ не ниже 14,000 ф. абс. выс. По величинѣ новооткрытый медвѣдь—съ нашего обыкновеннаго (*Ursus arctos*); отличается отъ него, главнымъ образомъ, качествомъ мѣха и цвѣтрасположеніемъ. У самца задняя половина туловища

¹⁾ На Танъ-ла и далѣе къ югу эта осока растетъ и на южныхъ горныхъ склонахъ.