

Въ западной своей половинѣ Южно-куку-норскій хребетъ, склоны котораго вообще вездѣ круты, отдѣляется отъ Нанъ-шаня долиною Бухайнъ-гола и широкою полосою холмовъ, залегающихъ вверхъ по этой долинѣ. При томъ, въ той же западной части, описываемыя горы болѣе дики, скалисты и бесплоднѣе, нежели въ своей части восточной. Здѣсь, на сѣверномъ склонѣ главнаго хребта, всѣ скаты луговые или поросшіе кустарниками; скалы же, состоящія всего чаще изъ сѣраго известняка и сѣраго гнейса, обставляютъ обыкновенно лишь ущелья и только изрѣдка появляются на вершинахъ и бокахъ горъ. Лѣтомъ, въ періодъ дождей, много воды въ видѣ ручьевъ и рѣчекъ; наоборотъ, въ западной части Южно-куку-норскаго хребта и даже въ восточной половинѣ на южномъ склонѣ къ Дабасунъ-гоби воды гораздо меньше.

Если слѣдовать съ запада, то первый лѣсъ на описываемыхъ горахъ появляется на меридіанѣ озера Курлыкъ-нора. Лѣсъ этотъ состоитъ изъ древовиднаго можжевельника, или *арцы*—классическаго дерева для горъ Центральной Азіи. Въ средней части Южно-куку-норскаго хребта можжевельные лѣса густѣютъ и въ нихъ появляется тянь-шаньская *ель* (*Abies Schrenkiana*), сначала въ небольшой примѣси, а затѣмъ мѣстами дѣлается преобладающею породою, въ особенности на сѣверныхъ склонахъ ущелій. Еще восточнѣе, тѣ же лѣса пропадаютъ и замѣняются кустарниками (*Caragana jubata*, *Potentilla fruticosa*, *Spiraea mongolica*? *Salix* sp.), свойственными альпійскому поясу восточнаго Нанъ-шаня. Эти кустарники растутъ всего болѣе на сѣверномъ склонѣ восточной части Южно-куку-норскаго хребта и густо укрываютъ горные скаты въ полосѣ отъ  $11\frac{1}{2}$  —  $13\frac{1}{2}$  тысячъ футовъ. здѣсь же разстилаются и превосходныя луговыя пастбища, по которымъ мѣстами кочуютъ тангуты.

Изъ млекопитающихъ въ описываемыхъ горахъ водятся: *маралы*, *кабарга*, *куку-яманы*, *волки*, *лисицы*, *зайцы*, *барсуки* и *хорьки*; изрѣдка попадаются *медведи* и *аркары*. Птицъ довольно много и между ними встрѣчаются представители орнитологической фауны восточнаго Нанъ-шаня, каковы: *си-фаньская куропатка* (*Perdix sifanica*), *альпійская синица* (*Poecile superciliosa*), *завирушка* (*Accentor rubeculoides*), *снигиревидная стренатка* (*Urocynchramus Pylzowi*) и др.

Въ Дуланъ-китѣ, какъ и у Дзунъ-засака, намъ не хотѣли продать ни верблюдовъ, ни лошадей, отговариваясь неимѣніемъ таковыхъ для продажи. Въ сущности, мѣстные власти опасались, чтобы мы, закупивъ новыхъ животныхъ, не направились бы куда-нибудь еще помимо Синина.